

**RATIO INSTITUTI  
CLINICI  
TICINIENSIS A  
MENSE  
IANUARIO...**

---

---

IOSEPHI FRANK  
RATIO MEDENDI

*P A R S II.*

---



**R A T I O**  
**I N S T I T U T I C L I N I C I**  
**T I C I N E N S I S**

*A MENSE IANUARIO USQUE AD FINEM JUNII*  
*ANNI MDCCXCV.*

QUAM REDDIT

**I O S E P H U S F R A N K M. D.**

Anteae Medicinae practicae atque Clinicae in Academia  
Ticinensi Professor extraordinarius; nunc Nosocomii  
Civici Vindobonensis Medicus Primarius.

PRAEFATUS EST

**I O A N N E S P E T R U S F R A N K.**

*Editio prima Italica*

*Animadversionibus locupletata*

CURANTE

**V A L E R I A N O A L O Y S I O B R E R A M. D.**

In Archigymn. Ticinensi Therapiae specialis, & Clinicae  
Professore extraordinario, Legionis Nationalis Ticinens.  
Chirurgo Supremo, Academ. Vindobonen., Berolinensis,  
Goettingensium, Ienensis, Bruxellensis, Mantuanae,  
Florentinae &c. Sodali.

**P A R S S E C U N D A.**

**T I C I N I 1797.**

---

**APUD HAEREDES PETRI GALEATII.**







## C A P U T IV.

### *Peripneumoniae nervosae, seu malignae.*

**A**D morbum periculi plenum, exponendum progredior. Eius amplam descriptionem apud SCHENKIUM (a), BALLONIUM (b), ELLERUM (c), SAUVAGESIUM (d), HUXHAMUM (e), SARCÓNEM (f) & in patris opere (g) habemus. Morbum hunc, nempe peripneumoniam nervosam, seu malignam auctorum, quae pestis adiungitur non raro integras provincias devastavit, hoc anno adeo frequentem a nobis iterum saepiusque visum,

A 3

- 
- (a) Obs. L. vi. p. 855. — Schol. ad observat. 46.  
 (b) Opp. omnia (Epidemica) T. I. p. 15.  
 (c) Observationes.  
 (d) Nosolog. method. Cl. III. o. 3. g. XXII. sp. 6.  
 (e) De febribus & de pleuritide.  
 (f) Von der Epidemie zu Neapel.  
 (g) Epit. T. II. p. 141.

pro febre nervosa habeo, cui symptomata pulmonis inflammati accellerant. Quae sententia facile sese probat considerantibus, utrumque morbum ab iisdem & causis generari, & auxiliis auferri. Peripneumonia maligna tamen, cum pars ad vitam tantopere necessaria, pulmo scilicet, quam maxime affecta sit, periculum ex febre simplici nervosa in mortales redundandas, longe superat. SCHENKIUS refert, anno 1348, peripneumoniam malignam tam insigniter grassatam esse, ut vix decima pars hominum superstes manserit. Sed duos lethalitatis eius fontes admittendos esse persuasum habeo; quarum unus a morbi ipsius indole pestilentiali, alter a methodo medendi perversa propullulat. Practici enim quamplurimi, indicationem e symptomatibus capientes, ob praesentiam doloris punctorii, respirationis difficilis, tum vero ob tussim ac excreatum sanguine notatum, ad venae sectiones, ad alvum purgantia, atque reliqua debilitantia confugiunt, quibus exigua virium vitalium portio reliqua ex toto deicitur, atque extinguitur. BALLONIUS, ubi de peripneumonia maligna loquitur, ita se exprimit: „in doloribus huiusmodi venae sectio non profuit, „ac querebant, num aliud esset remedium, „praeter istud solenne, quod primum ducitur in pleuritide? nam innumeri fato cri-

„ piebantur, quibus secta foret vena „ .  
 Idem de anno 1573. hæc refert: „ Exacta  
 „ hyeme, mense martio omnes paene pleuri-  
 „ tides funestæ, nullis cedebant remediis “ .  
 ELLERUS quoque, hanc aegritudinem, uni-  
 versae artis auxilia spernere, fatetur. Sunt  
 quidem præclari nominis practici, qui hanc  
 peripneumoniae speciem ab altera, phlogistica  
 nempe, rectissime distinxerunt. Celeb. BA-  
 GLIVIVS in pleuritide maligna sananda adeo  
 felix fuit, methodo, quae antiphlogisticae  
 prorsus contraria erat, ut *camphorae* in huius  
 morbi curatione specificam virtutem tribueret.  
 Cl. SARCONE in peripneumonia maligna,  
 quae *Neapolis* anno 1773. grassata est, sum-  
 mo cum fructu *opium* adhibuit, ita ut ma-  
 gnæ aegrotantium partem sanitati restituerit,  
 quum eodem tempore, qui medici venæ se-  
 ctionem instituebant, aegrotos omnes morti  
 mandaverint.

Iam mensibus Novembris ac Decembris  
 anni 1794. permulti peripneumonia nervosa  
 affecti in Clinico Instituto a patre meo tra-  
 ctati fuerunt. Quidam ex istis veram phlogi-  
 sticæ affectionis in pulmonibus imaginem præ-  
 seferabant: quod effecit, ut primum metho-  
 dus antiphlogistica adhiberetur: sub qua, om-  
 nia in peius ruere videbantur: donec cogni-  
 to demum *hosti* arma certiora opponerentur.

Aegroti verò, qui morbi naturam paulo clarius ostenderent, mox excitantium opè tractati, vix non omnes, licet morti, quam vitae proximiores in nosodochium delati fuissent, ad sanitatem felicissime perducti sunt. Idem ego fatear necesse est, de meis aegrotis, quos maligna pulmonum phlogosi affectos in Clinicum Institutum suscepi. Eorum numerus ad XXXI. ascendit, quorum VI. tantum mors contranitenti mihi abiecit. Methodum excitantem, de qua iam alibi (a) locutus sum, constanter in omnibus adhibui. Summa opii virtus & in hoc morbo pertractando, ex historiis mox proferendis patebit. Idem de *camphora*, *moscho* dicere oportet: quorum opè non pauci aegrotantes egregie restituti fuere. Sed & aliud remediū genus in auxilium vocavi. De *Radice Polygalae Senekae*, quae adeo a D. TENNENT (b) laudata est, loquor. Eam tamen pharmacis modo memoratis postponendam censeo, quod alvi profluvium & vomitum saepius ab ea generatum observaverim. Caetera, quae tum circa remedia in usum vocata, tum circa ipsius morbi decursum dicenda sunt, ex historiis, quas sum narraturus, patebunt. Historia quidem prima, secunda,

---

(a) Cap. III.

(b) Acta Edinburgh. T. V. p. 2.

ac tertia, quantum difficultatis invenerimus, ubi de peripneumonia nervosa ab inflammatoria distinguenda agebatur, ostendunt, quantumque nocuementi error in ea distinctione ( quae revera interdum & humani iudicii aciem & diligentiam fugit omnem ) commissus intulerit, monstrabunt. Historiae reliquae remedium praecipuorum nunc insufficientiam, nunc utilitatem palam reddent.

## HISTORIA I. (a).

*Josepha Baruffi*, e pago *Trivolzio*, nubilis, annorum 19, debito modo menstruata, die 28 Decembris elapsi anni derepente ab anorexia & vomitu correpta est. Tres dies sic, nullo alio comparente symptomate, transigit. Die vero prima Ianuarii, horis matutinis, a summo frigore, dolore ad latus dextrum thoracis, tussi molesta cephalalgia ac vomitu cruciata est aegrotata. Versus meridiem incaluit, ac tandem sudavit. Mane sequentis parva admodum febris remissio in conspectum venit; sed paulo post febris versus vespere exacerbatam est, auctis quoque reliquis sym-

---

(a) Quam descripsit D. M. N. PINCIARA Mediol.

promatibus. Die quarta morbi medicus pulverem, nescio quem, & cucurbitulas scarificatas praescripsit, sed in cassum. Sexta tandem mensis Ianuarii die, misera ad Clinicum Institutum delata, sequentia notatu digna obtulit: faciem valde rubram, oculos splendentes, respirationem difficilem, tussim cum excreatu sine sanguine, dolorem punctorium ad latus dextrum thoracis, circa sextam vel septimam costam veram, qui sub tussi & profunda inspiratione augebatur. Os viscidum, amarum, lingua sordida, sitis, ructus nidorosi, anorexia, nausea quoque aderant. Calor cutis auctus, pulsus valde frequens, & durus observabantur.

Difficile sane erat, his ita concurrentibus, morbi naturam determinare. Symptomatum gastricorum praesentia, uti & pulsuum frequentia de charactere febris nervosae suspicionem movebant. Verum, cum & in peripneumonia phlogistica appareant haec phaenomena, juvenilis aetate corporisque satis bonae constitutionis habita ratione, & considerata demum pulsus duritie, morbum pro peripneumonia inflammatoria declaravimus, ac prognosi valde dubia instituta, venae sectionem ad uncias x., potum antiphlogisticum, & rigorosam dietam praescribenda duximus.

*Mane 7.*

Sanguis vena eductus corium ostendit. Deliravit per totam noctem. Pulsus filiformes, valde frequentes. Dolor ille interim disparuit, ac rursus pauca sine excreatu absoluebatur. Alvus bis mota. Rebus ita procedentibus, novam venae sectionem instituere minime ausi sumus, qua de causa potius laxans antiphlogisticum praescribitur.

*Vespere.*

Semper deliravit. Caetera eodem modo incedunt. Alvus bis mota. Consideratis hinc singulis symptomatibus, habita damni a venae sectione, & alvi purgatione illati ratione, diagnosis institutae fallaciam agnovimus, illamque illico revocavimus, morbo pro peripneumonia nervosa declarato, quae tamen, cum ab initio inflammatoria forsitan fuisset, neglecta, in istam commutata sit. Oppositam ideo mox curandi methodum arripimus.

*R. Rad. polygal. senek. drachmas duas.*  
*Infund. in decoct. cort. peruv. s. q.*  
*Colat. unciaram novem adde.*  
*Syrup. cort. eiusdem unciam unam.*



*M. cap. omni bihorio unciam unam cum dimidia.*

*Bibat calide infusum sambuci.*

*Habeat iuscula carnea.*

*Mane 8.*

Tota nocte deliravit, quater alvum deposuit; quinquies e lectulo fugere tentavit. Symptomata peripneumoniae aucta. Accesserunt aurium tinnitus, manuum tremor, tendinum subsultus. Vox erat rauca, ac cutis calor urens, pulsus summa cum frequentia & inconstantia micabant.

*℞. Rad. serpent. virgin. drachmas tres.*

*Infund. in decoct. cort. peruv. s. q.*

*col. unciarum novem,*

*Adde,*

*Syrup. cort. eiusdem unciam unam.*

*Cap. ut supra.*

*℞. Rad. polygal. senek. drachmas tres.*

*Cog. c. aq. fontis libris duabus ad col.*

*unciarum viginti.*

*Adde.*

*Mellis despumati. uncias duas.*

*M.*

*Detur pro potu.*

*Vespere.*

Alvus semel laxata. Enarrata symptomata aucta, admodum malignam morbi indolem demonstrabant.

*R. Emuls. arab. uncias septem.*

*Mosch. opt. grana viginti.*

*Hausf. narcot. unciam unam.*

*M.*

*Cap. omni hora unciam unam.*

*Repet. potus.*

*R. Vini malacensis uncias sex.*

*Diaeta eadem.*

*Mane 9.*

Aliquantulum praeterita nocte obdormivit aegrotata, ac parum deliravit. Symptomatum cohors minori vi procedit; alvus clausa, lingua minus ficca.

*Repetantur omnia.*

*Vespere.*

Non deliravit, omnia symptomata imminuta. Alvus clausa.

*Repetantur singula. Iniiciatur clyster emolliens.*

*Mane 10.*

Tantisper quievit, non deliravit; sudavit, caetera eodem modo continuant.

*Repetantur omnia.*

*Vespere.*

Bis alvus laxata, omnia melius procedunt,

*Repetantur omnia. Augēatur moschus*

*ad grana triginta quatuor.*

*& haust. narcot. ad uncias duas.*

*Mane 11.*

Bene dormivit, ac toto corpore abunde sudavit. Dolor lateris disparuit. Tussis pauca, sine sputis. Tria urinae vasa mixta, cum sedimento lateritio.

*Repetatur medicina.*

*Vespere.*

Quievit, sudavit, disparuere omnino tinnitus aurium, tremores manuum ac tendinum subsultus. Nondum appetit.

*Repetantur omnia.*

*Mane 12.*

Per totam diem eodem modo ac heri se habuit, quare omnia repetenda iudicavimus.

*Mane 13.*

Res semper in melius vergunt. Parum sudavit, symptomata peripneumoniae, praeter tussin quandam, disparuerunt. Appetit, concessimus diaetam tertiam.

*Vespere.*

Nihil novi.

*Mane 14.*

Omnia bene succedunt.

*R. Decoñ. cort. peruv. uncias novem.*

*Emuls. arab. uncias tres.*

*Mosch. opt. grana decem.*

*Capiat omni bihorio uncias duas.*

A qua methodo cum non recederemus, die 23. mensis, aegrotata, perfecte sanata, ad convalescentes delata est, quo loco per tres dies mansit, ac demum bene valens domum petiit.

## HISTORIA II.

*Ioanna Rosi* ex loco Monti, 14 annorum, necdum menstruada, febribus intermittentibus subiecta, iam ante mensem pruritum magnum, ac valde molestum ad femur sinistrum persensit, Paulo post puitulae rubrae ibi comparuerunt, quae scalpendo disruptae, sanie acrem, partes vicinas mordentem effuderunt, largiori copia. Nunc vero partem affectam crusta obiectam vidimus, ita, ut malum pro herpete rodente declarandum esse existimaremus. Quindecim abhinc diebus febris intermittens anomala in conspectum se prodidit, quae nulla facta medela disparuit, sat magnam debilitatem relinquens. Die 10 Februarii, a parvo frigore derepente invaditur puella, cui calor urens, sitis inextinguibilis, cephalaea insignis, anorexia, atque summa virium prostratio, succedunt. Iam 24 horarum spatio febris saevierat, quum insignis dolor lancinans ad costas spurias sinistri lateris oriebatur. Aegrotata tunc temporis ad nosocomium deferitur, ubi venae sectio ad uncias novem instituitur, propinato simul decocto antiphlogistico. Imminuitur inde lateris dolor, sed vires longe magis deliciuntur. Admittitur puella in Scholam Clinicam die febris 4, mensis Februarii

23, horis matutinis, ac meo examini traditur. De summa cephalaea conquerebatur aegrotata, oculi erant fulgentes, genae rubrae, lingua sicca flavo muco obiecta, os valde amarum, & cutis urens. Respirationem invenimus difficilem, ac sub ipsa, dolor ille lateris sinistri quam maxime augebatur, immo decubitus in latus oppositum impossibilis erat. Tussi molesta, absque sputis solvebatur. Herpes non amplius saniem effundebat. — Pulsus aliquomodo plenus cum duritie micabat. Quae morbo originem praebuisse videbantur causae, erant nimii labores, ira, frigus, sat bono interim utebatur puella nostra victu. Morbus pro peripneumonia inflammatoria declaratus fuit, ac consilio ill. Professoris RAGGI, venae sectio ad uncias sex, clyster emolliens, fomentationes ad locum dolentem, & decoctum antiphlogisticum propinata sunt.

*Vespere,*

Dolorem aliquomodo imminutum invenimus. Continuabat eadem vi respirandi difficultas ac tussis. Pulsus pleni & duri, sed inconstantes, detegebantur. Nova venae sectio ad uncias octo imperata est, porrecta simul portione laxante antiphlogistica,

*Mane 24.*

Sopore ac deliriis detentam invenimus miseram. Dolor lateris, tussis eadem ratione prosequiebantur. Facies pallebat, excepta gena dextra, quae colore rubro notabatur. Pulsus erant parvi, contracti, alvus clausa. Hisce bene perpensis, viam medendi diversam incundam existimavimus, quae quidem postea & ill. Professoris RAGGI, denique in consilium vocati, approbationem obtinuit.

*R. Emulsion. arab. uncias septem,  
Mosch. grana viginti.*

*Cap. omni  $\frac{1}{2}$  hor. unciam unam.*

Appl. vesicans ut rubefaciens loco dolenti. Habeat iuscula carnea, & uncias sex vini optimi.

*Vespere.*

Melius se habuit aegrotata, ac minus infirme, pulsus maiori vi micabant. Alvus clausa.

*Rep. omnia.*

*Mane. 15.*

Tota nocte a vehemente tussi cruciata fuit; nunquam tamen deliravit. Caetera eodem modo se habebant. Accesserat aurium tinnitus. Alvum copiose bis deposuit.

*Rx. Emuls. arab. uncias septem.*

*Mosch. optimi scrupulum unum.*

*Hausf. narcot. unciam dimidiam.*

*Cap. ut supra.*

Habeat iuscula cum ovis, vinum ut heri, ac vini malvatici uncias octo.

*Vespere.*

Soporosa tantisper fuit, copiose sudavit, respiratio nunc facilis, nunc iterum per insultus difficilis redditur.

*Rx. Emuls. arab. uncias novem.*

*Mosch. opt. grana triginta.*

*Hausf. narcot. unciam unam.*

*Cap. more solito.*



*Mane 26.*

Soporosa fuit, ac per totam noctem deliravit. Quaestionibus stupida respondebat. Aurium tinnitus fortis, ac tendinum subsultus observabantur. Pulsus erant parvi atque contracti.

*R. Rad. polygal. senek. drachmas duas.*  
*Infund. in decoct. cort. peruv. fervid.*  
*s. q. colat. unciar. novem, adde*  
*Mosch. optim. scrupulum unum,*  
*Syrup. papav. unciam unam.*

*Cap. more solito,*

*R. Emuls. amygdal. libras duas.*  
*Aq. cinnam. uncias duas.*  
*Sacch. alb. drachmas tres,*

*M. detur pro potu.*

*Vespere.*

Delirabat quammaxime, ac divaricatis cruribus in lectulo iacebat. Inexplebilis sitis aridas fauces exurebat. Pulsus frequentissimos, & violentos tendinum subsultus observavimus.

*Rep. singula.*

*Mane 27.*

Pulsus in minuto primo 130. micabat. Nox inquieta fuit, & semper aegrota deliravit. Caetera ut heri vespere. Dolet valde ab attractu abdomen; alvus ter soluta.

*Rep. medicina; bibat calide infus. chamomillae, illiniatur abdomini liniment. volatilis. Viâus idem.*

*Vespere.*

Delirium & sopor fere disparuerunt, aegrota hilaris.

*Rep. omnia.*

*Augeatur vini dosis ad libram unam.*

*Mane 28.*

Optime per omnem noctem dormivit. Post aquam frigidam assumptam, semel vomitum passa est. Dolorem, qui thoracem cinguli instar circumdaret, accusat. Pulsus in minuto primo 120. micabat. Sitis multa, caetera eodem modo.

*R. Emuls. arab. uncias septem.  
 Mosch. opt. grana triginta.  
 Syrup. papav. alb. uncias duas.*

*Cap. more solito.*

*Potus excitans.*

*Vespere.*

Quam optime se habet aegra. Toto corpore sudat. Pulsus vix naturali frequentior. Parum fitit.

*Rep. med., augeatur mosch. dosi ad grana quadraginta.*

*Mane 1. Martii.*

Bene dormivit, debilitatem maiorem accusat, forsitán quia ter alvum copiose deposuerat. Aliqua fames.

*Rep. med., cui adde extract. cort. peruv. unciam dimidiam.*

*Concedantur iusculum, ova, ac dimidia pars pulli.*

*R. Vini malvat. uncias oño.*

*Cap. paulatim.*

*Vespere.*

Bene se habebat, ac de abdominis dolore tantum conquerebatur.

*Rep. med.*

*Illiniat. abdom. liniment. volat.*

*Mane 2.*

Deliravit hac nocte, saepe tussit. Caetera continuant.

*Rep. med., cui adde kermes. mineral. grana duo.*

*Vespere.*

Bene se habuit, parum a tussi molestata est. Copiose sudavit.

*Rep. singula.*

*Mane 3.*

Dormivit optime, viresque redeunt.

*Rep. med.*

**B 4**

*Mane 4.*

Perfecte convalescens est puella.

*R.* Emuls. arab. uncias novem.

Mosch. opt. grana viginti.

Extrañ. cort. peruv. unciam dimidiam.

Cap. ut supra.

*Diaeta eadem.*

Vini malv. uncias quinque.

*Mane 5.*

Perbene se habet.

*R.* Decoñ. cort. peruv. uncias sex.

Extrañ. cort. eiusdem drachmas duas.

Emuls. arab. uncias sex.

Cap. omni hora uncias duas.

*Mane 6.*

Ad convalescentes demissa est aegrotas,  
atque post aliquos dies domum sana petiit.

Venatio RIGAMONTI.

M. D.

## HISTORIA III.

*Carolus Belloni*, vir 46 annos natus, olearius, die 7 Aprilis, postquam ex ecclesia egressus fuit, derepente ab atroce, hepatis regioni infixo dolore, prehenditur, cui mox frigus, dein calor, successerunt. Paulo post dispnoea, capitis lumborumque dolores, ac tussis in conspectum venire. Chirurgus quidam tunc venae sectionem instituit cum summo levamine. Die 12 tandem mensis delato in Scholam Clinicam aegroto, faciem observavimus rubram, respirationem brevem & difficilem, tussim cum sputis sanguineis. Dolor hepatis persistebat, sed ab attactu minime augebatur. De scapularum dolore conquerebatur. Pulsus erat modice frequens, plenus ac durus. Habita ratione aegrotantis, corporis aspectu firmi, tum aetatis, temporis verni, beneficio a V. S. instituta accepti, atque pulsum itatus, quum nulla causa debilitans pateret, morbum pro peripneumonia inflammatoria declaravimus, ac prognosi valde dubia instituta, V. S. ad uncias novem praescripsimus, concessa pro potu aqua fontis, ac rigorosa diaeta.

*Mane 13.*

Dolor ille post cruoris emissionem multum imminutus. Pulsus minus frequentes.

*R. Haust. salin. uncias septem.*

*Tart. emet. granum unum.*

*Cap. omni bihor. cochl. duo.*

*Vespere.*

Quinques alvum deposuit, minime suavit, dolor ille atque tussis eodem modo saeviunt. De summa debilitate conqueritur aegrotus. Apparuit nunc tantum ex repetitis quaestionibus viro propositis, eum pellagra laborasse; quare seposita omnino methodo antiphlogistica, huic contrariam arripuimus.

*R. Emuls. arab. uncias septem.*

*Kermet. miner. grana tria.*

*Haust. narcot. unciam unam.*

*Capiat omni hor. unciam unam.*

*Vini opt. uncias septem. Habeat iuscula carnea.*

*Mane 14.*

Soporosus per totam noctem fuit, ac divaricatis cruribus in lectulo stupidus decubuit. Alvus quinquies laxata, caetera eodem se habent modo.

*R. Rad. polygal. senek. drachmas duas.  
Inf. in decoct. cort. peruv. ferv. s. q.  
col. unciarum novem*

*Addē syrup. papav. alb. unciam unam.*

*Copiat omni hora unciam unam.*

*Vespere.*

Bis alvum deposuit, sudavit ad caput. Continuat tussis cum sputis sanguineis.

*Rep. med.*

*Habeat Vini optimi uncias novem.*

*Mane 15.*

Per totam noctem soporosus fuit, expe-



etoratio pauca. Dolor ad hepar prevertit novus, immo ad lien insurrexit. Pulsus debiles, tendines subsiliunt. In consilium vocavimus ill. Professore RAGGI, qui sequentia ut praescriberemus, suavit.

*R. Decoñ. cort. peruv. uncias novem.  
 Camph. mucilag. arab. sol. drachmam  
 dimidiam.  
 Syrup. papav. unciam unam.*

*M. Capiat ut supra.*

Illiniatur abdomen cum linimento volatili & camphora, ac imponantur denique fomenta emollientia. Habeat vini rubri libram unam.

*Vespere.*

Medicinae dimidiam partem tantum assumpsit aegrotus, qui gratiorem appetit. Bis alvum deposuit. Caetera symptomata eadem ratione persistunt.

*R. Decoñ. cort. peruv. uncias quatuor.  
 Aq. cinnam. uncias tres.  
 Mosch. opt. scrupulum unum.  
 Syrup. papav. uncias duas.*

*Cap. omni dimidia hora unc. dimid.*

*Rx. Vini malvat. uncias sex,*

*Capiat paulatim, continuet in caeteris.*

*Mane 16.*

Male res procedunt. Facies hippocratica.  
Appetit nihilominus.

*Rep. med. Applicentur duo rubefacientia  
ad brachia. Initiat. clyster. ex camphor. & de-  
coct. chinæ. Rep. diæta cum ovis ac frictura.*

*Vespere.*

Soporosus aeger ac semi delirans, morti  
proximior fuit, quam vitæ.

*Repet. omnia,*

*Mane 17.*

In agone hærebat.

Versus meridiem extinctum invenimus.

*Sectio Cadaveris.*

Aperito thorace, pulmones cum pleura

arcte concretos ubique invenimus. Pulmo una de quaque pseudomembrana ac lymphâ coagulabili coopertus erat. In cavo thoracis dextro sat copiosam aquam deteximus. Ipsa pulmonis substantia vix inflammata erat. In abdomine nihil praeter naturam vidimus. Hepar enim, licet mole auctum, nulla tamen inflammationis indicia ostendebat.

*Joseph BARUFFINI*  
*ex Casal. Maggiore M. D.*

#### HISTORIA IV.

*Josephus Rusca*, Ticinensis, 17 annorum juvenis, iam a 4 annis febre quartana, quae paucis abhinc diebus saevata fuit, laborabat. Postquam corpus laboribus permultis gravissimisque defatigaverat, die 14 Aprilis a febre continua prehensus est. Secunda morbi die vehemens dolor ad cordis scrobiculum ortus est, qui per totum abdomen, nec non per ipsum pectus sese extendit. Secuti sunt respiratio difficilis, tussis, ac decubitus in latera fere impossibilis. Domi remansit, nulla adhibita medela, usque ad diem 20 mensis, qua ad nosocomium inferius delatus fuit, ubi mox

V. S. instituta fuit, sine aegrotantis levamine. Mane 20 Aprilis in Clinicum Institutum delato iuvene, praeter iam exposita peripneumoniae symptomata, magnam virium deiectionem observavimus. Aegrotus sitim & oris amaritiam accusabat. Tussis paucis sputis, nullo sanguine tinctis, absolvebatur. Calor cutis erat mordax, ac pulsus contractus, in minuto primo 116 ictus ostendebat. Morbo pro peripneumonia nervosa declarato, pessima tam neglectae aegritudinis prognosi instituta, sequentia praescripsimus.

*R. Emuls. arab. uncias novem.*

*Mosch. opt. scrupulum unum.*

*Cap. unciam unam omni dimidia hora.*

*Potus excitans.*

Habeat iuscula carnea, & uncias octo vini. Applicetur vesicans ut rubefaciens loco dolenti, & fomenta super abdomen. Iniiciatur clyster ex emulsione arabica.

*Vespere.*

Omnia eadem ratione procedunt. Aspectus aegrotantis tamen peior.

*Repet. singula, excepto vesicante.*

*Mane 21.*

Respiratio difficillima ac summa anxietas per totam noctem aegrotantem cruciaverunt. Pulsus magis frequentes, alvus semel laxata.

*Rep. omnia.*

*Vespere.*

Omnia in peius ruebant, ac suffocationem instantem annunciabant.

*Rep. med. aucto moscho ad grana triginta, & applicentur duo vesicantia ut rubefacientia ad brachia.*

*Mane 22.*

Obiit suffocatus.

*Cadaveris sectio.*

Aperto thorace, magnam pulmonum inflammationem deteximus. Pulmones erant cum pleura concreti, ac lymphæ coagulabili cooperiti. Ipsa hæc lymphæ bronchia implebat.

In abdomine nil morborum invenimus.

GRATOGNINI

M. D.

HI-

## HISTORIA V.

*Molitor ex Sancto Leonardo*, 40 annorum, sat bene nutritus, die nona Maii, cum ventis per multum tempus expositus fuisset, incepit subsequente die se male habere, languere, & horrore sat forti, per quatuor horas perdurante, prehendi; dein incaluit; vix post caloris invasionem, dolor intra quartam & quintam costam veram sinistri lateris, insurrexit cum tussi frequente, sicca, dolorem exacerbante. Decubitus in utroque latere difficillimus, debilitas magna, aurium susurrus, & capitis dolores aderant. Febris peripneumoniam concomitans remisit matutinis horis: exacerbabatur vespertinis. Cum hisce symptomatibus per quatuor dies, absque pharmacis, lecto decumbere coactus fuit, dein chirurgus advocato, atque soli dolori innixo, venam hic aperuit. Vix aperta vena, dolor per quadrantem horae tantisper remisit, dein eadem, ac antea, intensitate, continuavit; debilitas increvit, atque per quatuor adhuc dies, cum decocto hordei aeger morbum oppugnavit, dein quum res quotidie in peius rueret, ad nosocomium se transferri curavit, atque ad clinicum recepto aegrotō, haec ulterius obser-

*Pars II.*

C

vavimus. Difficillime respirabat, de immenso pectoris pondere conquerebatur, frequenter tussiebat, nihil vero expuebat, moesta erat facies, cephalaeam maximam, & aurium surrum accusabat. Alvus regulariter movebatur, calor cutis urens, pulsus frequentes, debiles, summopere inconstantes, ac tendinum subsultus aderant. Hisce consideratis, de peripneumonia nervosa non dubitavimus. Pro morbi causa nihil, praeter tempestatis mutationes adducit aeger; quare prognosin discrimine plenam pronuntiantes, praescripsimus sequentia:

*R. Rad. polygal. senek. drachmas duas.  
 Infunde in decoct. cort. peruvian. suff.  
 quant.  
 Colaturae unciae novem, adde  
 Syrup. papav. albi unciam unam &  
 dimidiam.*

*M. Cap. more solito.*

*Dietæ II. cum libra una vini.*

*Mane 8. m. d.*

Sat bene hac nocte dormivit, aliqua

in febre remissio aderat, frequenter tussiebat, sed tussis est humida, dolor pectoris tantisper imminutus, difficultas vero spirandi continua.

*Reper. medicina. Sumat omni dimidia hora cochlearia duo.*

*Diaeta II. cum libra una & dimidia vini.*

*Vespere.*

*Febris, & peripneumoniacae symptomata aucta sunt.*

*Quare praescripta continuavimus, medicinae tantum addendo guttas quindecim laudani liquidi.*

*Mane 9. m. d.*

Non multum hac nocte dormivit, semel alvum deposuit, dolor pectoris valde urget, tussis frequens, cum excreatu copioso, difficultas spirandi continuat; febris eodem in statu, ac heri mane.

*Reper. omnia.*

C 2



*Vespere.*

Dolor pectoris vix persentitur, difficultas spirandi continuatur, magna febris exasperatio, tendinum subsultus frequentiores.

*Repet. omnia.*

*Mane 10. m. d.*

Multum hac nocte dormivit, dolor pectoris disparuit, difficultas spirandi manet, tussis cum excreatu aquoso continuatur, remissio febris sat conspicua.

*Repet. medicina, & loco laudani liquidi exhibeatur ætheris vitrioli drachma una.*

*℞. Vini malvat. uncias sex.*

*Vespere.*

Dolor nullus, sed maxima spirandi difficultas observatur, cum febris exacerbatione magna, tremoribus crebrioribus: vires magis concenterunt; semel alvum deposuit.

*R. Rad. polyg. senek. drachmas duas.  
Infunde in decocto corticis peruviani.*

*s. q.*

*Colat. unciarum novem adde  
Laudani liquidi guttas quindecim.  
Aetheris vitrioli drachmam unam.  
Syrup. papav. albi uncias duas.*

*M.*

*Sumat omni dimidia hora cochlearia duo.*

*R. Vini malvat. uncias sex.*

*Mane 11. m. d.*

Res in melius vertuntur. Multum dormivit hac nocte, & sibi met ipsi relictus, illico obdormit. Difficultas respirandi imminuta, tussis cum excreatu aquoso continuat, pulsus magis elevati.

*Repet. omnia, absque laudano liquido.*

*Vespere.*

Parva exacerbatio. Non amplius tantam accusat debilitatem, facies melior, difficultas spirandi, ac tussis continuat, semel alvum deposuit.

*Repet. medicina cum laudano liquido.*

*Mane 12. m. d.*

Facilius respirat, & febris symptomata imminuuntur; tussis cum excreatu copioso continuat, bene dormit, appetit.

*Repetantur omnia.*

*Diaeta II. cum dimidia columba, & libris duabus vini.*

*Vespere.*

Pauca exacerbatio, debilitas imminuitur, bene respirat, tussis cum excreatu copioso continuat.

*Repet. omnia.*

*Mane 13. m. d.*

Pauca febris, bene dormivit, semel alvum deposuit, caeterum bene se habet.

*Repet. omnia.*

*Vespere.*

Sine manifesta caussa, magna exacerbatio

accessit, debilitatem magnam accusat, aspectus omnino mutatus, calor cutis urens, tendinum subsultus crebriores, pulsus parvi, irregulares, anxietas magna.

- R. Decoñ. cort. peruv. uncias novem.*  
*Camph. mucilag. gummi arabici solutae drachmam dimidiam.*  
*Syrup. corticum aurantiorum unciam unam.*

*M.*

*Capiat omni hora cochlearia duo.*

*Duo rubefacientia ad suras. Dein*

- R. Camph. mucilag. arab. subactae drachmam unam.*

*Infus. chamom. uncias sex.*

*M.*

*Dentur doses tales Nro. tres, pro tribus clysmatibus, omni bihorio iniiciendis.*

*Mane 14. m. d.*

Nunquam hac nocte dormivit, continuo musitavit, ascaridem evomit, semel alvum deposuit. Caetera eodem modo continuant.

C 4

*In omnibus, praeter rubefaciencia, continuat.*

*Vespere.*

*Nulla in morbo mutatio.*

*In omnibus continuetur.*

*Mane 15. m. d.*

Tota nocte dormivit, semel alvum deposuit, pulsus parvi, irregulares, calor cutis non tantus, facies multum collapsa, magna anxietas.

*R. Decoñ. cort. peruv. uncias septem.*

*Aquae cinnamom. uncias tres.*

*Camph. mucilag. arab. solut. scrupulum unum.*

*Syrup. cort. aurant. unciam unam.*

*M. cap. ut supra.*

*Vini malvat. uncias sex.*

*Vespere.*

*Magna exacerbatio; tentat continuo e*

lecto surgere, sed vires non fiunt, calor urens, difficultas spirandi, pulsus magis elevatus.

*Continuet in omnibus.*

*Mane 16. m. d.*

Magna remissio; parum hac nocte dormivit, multum deliravit, pulsus magis elevatus, facies mellior, debilitatem magnam accusat, spirandi difficultas cum tussi continuat.

*R. Decoñ. cort. peruv. uncias octo.*

*Aquae cinnamom. uncias tres.*

*Extracti corticis peruv. unciam dimidiam.*

*Aetheris vitriol. drachmam unam & dimidiam.*

*Syrup. cortic. aurant. unciam unam.*  
*M.*

*Capiat omni bihorio cochlearia duo.*

*Vini malvat. uncias sex.*

*Vespere.*

Pauca febris; sed respirandi difficultas continuat, vires insurgunt.

*Quum multa medicina adhuc adesset ,  
sumat , quod remanet , dein quiescat .*

*Mane 17. m. d.*

Bene dormivit. Vix febris symptomata  
observantur, & de nulla re conqueritur, nisi  
de tussi & spirandi difficultate .

*Rep. medicina , addendo guttas quindecim  
laudani liquidi .*

*Vespere .*

Nil, praeter aliquam spirandi difficulta-  
tem ac tussim conqueritur .

*Repet. omnia .*

*Mane 18. m. d.*

Bene dormivit, tussis summo opere agitat  
aegrotum, difficultas spirandi imminuitur .

*Rx. Decoñ. cort. peruv. uncias sex .*

*Emuls. arabic.*

*Aquae cinnamom. ana uncias tres .*

*Extr. cort. peruv. drachmam dimidiam .*

*M.*

*Capiat omnia hora cochleari duo .*

*Vespere.*

Nihil, praeter spirandi difficultatem.

*Sumat, quod remanet medicinae; dein.*

*℞. Infus. sambuc. uncias novem.*

*Hausl. narcotici uncias tres.*

*M.*

*Sumat. omni bihorio cochlearia duo.*

*Mane 19. m. d.*

Spirandi difficultas disparuit, sed tussis  
continuat.

*℞. Decoñ. cort. peruv. uncias oño.*

*Aquae cinnamom.*

*Emuls. arab. ana uncias tres.*

*Extrañ. cort. peruv. drachmam dimi-  
diam.*

*Hausl. narcot. uncias duas.*

*M.*

*Sumat omni hora cochlearia duo.*

*Vespere.*

Nihil, praeter aliquam tussim observamus.

*Sumat, quod remanet, medicinae.*



*Mane 20. m. d.*

Bene dormivit, & si excipias aliquam  
tussim, & debilitatem a morbo superstitem,  
prorsus convalescit.

*℞. Decoñ. cort. peruv. uncias novem.*

*Emuls. arab.*

*Aqu. cinnamom. ana uncias tres.*

*Extr. cort. peruv. drachmas duas.*

*Hausß. narcot. uncias duas.*

*M.*

*Capiat omni hora cochlear. unum.*

*Vespere.*

Bene se habebat, & ad convalescentes  
fuit demandatus.

*Anton. Eliseus BALDUZZI.*

*ex Molendino de Tortis, Derthonensis.*



## C A P U T V.

*Scarlatinae nervosae.*

**P**Raeter scarlatinam, vix aliud, quod sciam, exanthema primum, hoc anno recognovit. Ipsae quoque scarlatinae quammaxime inter se differebant, quum febrem nunc inflammatoriam, nunc nervosam comitem haberint. De scarlatina *phlogistica* iam alio loco (a) mentionem inieci, nunc de *nervosa*, ab illa toto coelo diversa, dicam aliqua. Recte mihi Nosologi scarlatinam inflammatoriam in *leviorem gravemque* dividere videntur. Eandem hinc scarlatinae nervosae distinctionem lubens & ego statuerim; namque ex eo, quod hoc exanthema nervosa stipetur febre, non ideo semper illud ad eas scarlatinas malignas, quae cynanchem gangraenosam comitem habent, pertinere existimandum est. In

---

(a) Cap. I. Hist. I.

Clinico Instituto IV. scarlatinae nervosae levioris exempla, atque alterum gravioſis, obſervata fuerunt. Singuli aegroti ſub methodo, contra febres nervoſas commendata, cito perfecteque ſanati exierunt. Sepoſita methodo evacuante, quae nonniſi ſcarlatinae phlogiſticae convenit, aegrotantes non atmosphaerae frigidiuſculae, ſed potius calidae, ne vires iam fractae ultro deprimerentur, commiſi. Eſſet enim facile, ut neglecta hac lege, in exanthemate hoc idem accideret, quod in variolis quotidiana experientia docet evenire. A frigore quim eruptio variolae benignae promoveretur mirifice, ſed retinetur illa malignae atque reprimitur. Quidquid vero nocuenti malique in aegrotis conſpiciendum ſe praebat, non tamen id a *repulſione* exanthematis mihi videtur derivandum eſſe: quum retropulſio ipſa iam alterius cauſae effectus ſit. Longe rectius tum dicemus; diſparuit exanthema, ſeu retroceſſit, quia morbus increvit, non vero hic increvit, quia exanthema develiquit exteriora. Quando, Dii boni, ceſſabimus deum, effectum pro cauſa, cauſamque pro effectu venditare (\*)! Ut vero ad illud, unde

---

(\*) Anno 1783 ſcarlatina nervoſa graſſabatur Goettingae, pleraque aegrotantium pars octavo circiter morbi die intumeſcebat. Invadebat abſque dubio haec leu-

discessi, redeam argumentum, silentio quatuor illas scarlatinae levioris historias, quum nihil

cophlegmatia illos homines, quibus aut tarda, aut rara fuerat eruptio, ipsumve exanthema iusto celerius defloruerat. Ita, inquit WEDEMEJER (*Historia Scarlatinae, nuper Goettingae grassatae. Ibi 1785*) per insidias pugnabat vis morbi, quae in internis claustris remanebat. Scarlatinae morbus non semper epidemice homines aggreditur; uti a nonnullis ferebatur medicis, verum etiam sporadice genus humanum afficit. Quae ab Auctore nostro traduntur historiae, hoc clare demonstrant, nullumque epidemiae indicium ostendunt. Scarlatina phlogistica non tantum, ut scarlatina nervosa, medici considerationem postulat, quippe quae variis, iisque atrocibus apparet symptomatibus stipata. Liceat mihi aliqua exempla ab Auctoribus desumpta hic loci tradere, ut magis magisque Tyrones medici scarlatinae nervosae historiam singulis numeris absolutam sub oculis habeant, Auctorisque nostri divisionem comprobata scarlatinae nervosae *levioris & malignae* exemplis confirmatam percipiant.

#### Observatio I.

„ Mense Novembris 1759 (STOERK *Annus medicus II. pag. 46.*) cum Vindobonae in Nosocomio Pazmariano ex febris continua catarrhali, cui saepe miliaria exanthemata superveniebant, multi decumberent, alia febris non paucos corripuit, quae primis diebus valde mitis erat: etenim levis tantum & obtusus aderat capitis dolor, appetitus languet, pulsus fuit naturali paulo celerior, nec tam plenus, nec durus, nec suppressus, sitis mediocris, lingua humida alba, oculi solito minus vivaces. Alvus quotidie naturalis prodit, urina crassam in medio nubem gessit. Incipiente quarto die omnia symptomata subito exacerbata sunt. Pulsus

observatione valde dignum contineant, praeteribo. Sed aliam, de qua iam dixi, historiam,

summa violentia exagitabatur ita quidem, ut eodem die binae, ternaevae sat largae venae sectiones debuerint institui, caput acutissime doluit, in pectore orta est anxietas, & respirandi magnus labor, lingua fuit aridissima, oculi rubore suffulti & protuberantes, sitis immaniter aucta; totum corpus, maxime vero extrema calor urens invalit; urina fuit ruberrima, crassa, quasi multo sanguine tincta; accessit delirium, sopor, corporis inquietudo. Factis necessariis venae sectionibus, & data copiosissimo potu diluente, nitroso, sub finem diei quarti tota cutis aspera, seu anserina apparuit, & mox rubuit colore scarlatino. Nullum tamen symptoma inde levatum est, & aegri frequenter tussitarunt, & noctem habuerunt admodum inquietam. Quinto die praegresso per universum corpus largo sudore, remisit calor urens & tussitatio; mox pruritus cutim occupavit, dein visae sunt numerosae pustulae albicantes, opacae, magnitudinis & figurae diversae, & quaedam ex his confluentes sat magnas vesicas efformarunt. Pustulae hae densissimo agmine collum, pectus, & abdomen obsederunt; in facie autem erant nullae, in extremitatibus paucae. Factis his eruptionibus quidam aegri se multo melius habuerunt, disparuit enim sopor, abiit delirium, sitis & pulsus velocitas imminutae sunt. Immo pulsus in quibusdam fuit bonus & aequalis, & omnia symptomata adeo mitia, ut totum opus soli naturae tuto nunc potuerit committi. Aliqui autem manserunt soporosi; continuo delirarunt; eorum pulsus fuit debilis, inaequalis, intermittens; urinam & faeces inscie dimiserunt, tendines subiliciorum, & artus convulsionibus exagitabantur. Sexta die in eodem statu persistere. In principio septimi diei ortus est horror, dein ingens fri-

riam, utpote summi moimenti, quia luculentissimum praebebat inflammationis nervosae exemplum.

*Pars II.*

D

gus omnia membra perrepsit, quod ultra horam duravit, extrema reddidit gelida, rigida, & tantum induxit virium prostrationem, ut mortem allaturum videretur. Cessante tamen hoc frigore mox aegri ad se redierunt, nec delirarunt amplius, pulsus fuit aequalis, liber, minus velox, & ab eo tempore vires apertae sunt. Eodem autem die pustulae omnes magis elevatae sunt, & redditae pellucidae; etenim limpidissima lymphadebantur repletae: color scarlatinus coepit evanescere, & sitis imminuitur; urina fuit crassa, turbida, & copiosum sedimentum subfuscum deposuit. Aegri quinto die magnum levamen perceperunt, & habuere symptomata admodum mitia; ii septimo die levem tantum horripilationem perceperunt: pulsus fuit paulo celerior, & pustulae magis repletae sunt & pellucidae; reliqua autem omnia optimo in statu permanserunt. Octavo die nihil mutatum est, nisi quod iis, qui septimo die male habuerunt, aliquoties alvus biliosa, liquida, foetida cum magna euphoria prodierit; iis vero alvus fuit naturalis, qui minorem septimo die molestiam perceperunt. Nono die febris fuit admodum exigua; urina fere naturalis; alvi profluvium siluit; color scarlatinus sensim in naturalem abiit; pustulae partim ruptae sunt, & limpidum serum foderunt, partim concenterunt, & exsiccatae sunt. Decimo die tota fere cutis naturalem colorem habuit, & omnia erant meliora, & quidam ex his aegris ab omni febre liberi, iam per aliquot horas extra lectum fuerunt. Undecimo die in omnibus desinit febris, rediit appetitus, epidermis lamellatim secessit, intra paucos dies viguerunt vires & valetudo, fuit integerrima.

plum in medium proferam. Aegroti nempe, praeter universae cutis inflammationem scarlati-

*Observatio II.*

„ Anno 1763 in Cephaloniae urbe ( Auctor est quidam Doctor ZULATTO & observatio extat in *Tom. II. del Giornale medico del Dott. ORTESCHI* ) vicinisque locis hiemi praehomidae, nec multum frigidae successit ver siccum, & solito frigidius. Siccitas autem tanta fuit, ut per quatuor subsequentes menses nulli imbres deciderint, & ne rores quidem nocturni, qui calorem & siccitatem illius insulae temperare solent, adfuerint. Mense maio ad finem vergente tempestas repente in calidam & opprimentem mutata est. Tunc praeter febres tertianas duplices continuas, purpura scarlatina tam in urbe, quam in vicinis pagis vagari coepit, pueros praesertim, & adolescentes utriusque sexus corripiens, immunibus, qui annum vigesimum praetergressi erant, relictis. In aliquibus morbus incipiebat ab horroribus vagis cum virium deiectione & acutissimo capitis dolore; in aliis a subitanea lassitudine cum intolerabili totius corporis ardore. Fere omnes quaerebantur appetitus defectum, sitis magnam atque inexplicabilem, oris ariditatem & amaritatem, & membra veluti fracta. His praeterea lingua erat sordida, muco albo & viscido obducta, & nausea perpetua, quam interdum excipiebant vomitus spontanei aquosi, spumidi, flavi, atque amari. Secundo, tertio, aut quarto die febris, quae semper vehemens erat, accessu collum primum, deinde totum corpus rubore suffundebatur. Rubor autem magis vel minus intensus apparebat, prout morbus gravior, vel mitior erat futurus. Rubore non minor erat cutis ardor & siccitas, quibuscum coniungebatur. Colorem hunc vere purpureum hic illic interfinguebant quaedam minutissimae

nosam, sat profundam, faucium quoque inten-

D 2

bullulae non valde elevatae, semina fragior magnitudine aequantes, interdum etiam minores. Exanthematica huiusmodi eruptione non febris, non eius symptomata minuebantur; immo atrocius mox capitis dolor intendebatur; pectoris oppressio, anxietas & inquietudo magis assidue premebant. Nonnunquam accedebat etiam delirium; immo infantes inter brevem, interruptumque somnum subinde convellebantur. Punctiones vero, sive mavis morsus, quos circa cordis serobiculum percipiebant, molestiores fiebant. In plerisque alvus adstricta erat. Hi feбри vehementiore & gravioribus symptomatibus afficiebantur. In aliis iam ab initio fluebant excrementa foetidissima, crocea, lumbricis permixta, atque in his mitior morbus erat. Quibusdam pueris, qui videlicet facie pallebant & micilenteros videbantur, lumbrici non pauci tum ore, quam ano sponte & sine aliis excrementis prodibant, modo vivi & vegeti, modo mortui & corrupti. Per utramque hanc viam, spatio quatuor dierum amplius quinquaginta lumbrici a puella duodecimi annorum excreti sunt. Fere omnibus post quartum diem dolor, tumorque parotidum supervenebat. Quibus huiusmodi tumor deerat, fauces inflammatione tentabantur, & difficilis deglutitio evadebat. Paucissimi ab alterutro incommodo liberi exitere. Nemini parotides suppurarunt. Resolvebantur enim modo citius, modo tardius, prout rubor & febris evanescebant, & prout deiectionibus morbi fomes depellebatur. Satis erat eas inungere linimento aliquo, cui camphora adiecta esset. Eodem pariter ordine, eademque naturae providentia faucium inflammationi minuebatur. Die septimo, aut etiam ante in breviori morbo, in longiori vero die undecimo, duodecimo, aut decimo quarto rubor quadam quasi tenuissima farina aspergi videbatur,



sam phlogosin ostendebat, quae methodo anti-

qua sensim cuticula albescerebat, principio in superioribus partibus facta. Tunc sic pruriebat cutis, ut scabere eam oblectamento esset. Sic farina illa secedens, aut cuticula in squamas soluta decidebat. Tum febris cito mitigabatur, interdum etiam ex toto cessabat, etsi adhuc ad aliquot dies rubor persisteret. Appetitus redibat cum somno longiori & paciori. Sudor vero nullus erumpebat, nisi discusso penitus scarlatino rubore. Urinae, quae inter initia parcae, tenues & aquaeae fluebant; progressu & inclinatione uberiores & saturiores factae sunt. Hinc vires & sanitas redintegrabatur “.

### Observatio III.

„ Per febrem adeo vehementem se manifestabat epidemia scarlatinae (NAVIER *de constitutione epidemica scarlatinae anno 1751 in Catalonia grassatae*. Exstat in quodam huius medici opere, cui titulus *Dissertation ou forme des lettres sur plusieurs maladies populaires*. Paris 1753), quae animi deliquiis, lassitudinibus spontaneis, capitis, fauciumque doloribus degluritionem impredientibus comitata erat. Secundo die, & saepe post vigintiquatuor horas, vel triginta in toto corpore maculae rubrae, vivido scarlatino colore latae, manus magnitudinem saepe excedentes, figurae singularis, & dorsum, pectus, femora, & nates saepe ita tegentes, ut unica tantum esse videretur, apparuerunt. Hae maculae, quovis fere momento disparentes se in alia loca erysipelatis more conferre videbantur, in quibus antea non fuerant. Manus, easdem tangens, calorem vividum, & ardentem, praecipue in adultis, sentiebat, & cutis ruberrima digito compressa albescens, remoto digito statim rursus rufescebat. Pulsus parvus, & frequens erat; respiratio difficilis, & intercepta, & singultosa in plu-

phlogistica manifeste augebatur, ac tandem

D 3

rimis esse videbatur. Halituosus vapor e pulmonibus egrediens adeo calidus, & prens deprehendebatur, ut unusquisque hunc percipiens faciem ab aegro statim avertere cogeretur. Haec febris etiam interdum cum manuum, & brachiorum inflatione coniuncta fuit, integrasque familias aut insimul, aut successive invasit. Quibusdam lingua erat valde sicca, plurimis vero humida, & venter flatibus distentus. Iis, qui ab atroci hoc malo evadebant, epidermis quinto, vel sexto die per squamas decidebat, quin immo adolescenti tredicim vel quatuordecim annorum tota manus pedumque cuticula exceptis unguibus vero non illico in primo morbi impetu succurrebatur, escaræ gangraenosae in fundo faucium versus arcum, & velum palati superveniebant; & ita celeriter proserpebant, ut oesophagum, asperamque arteriam ante occuparent, quam illae percipi, curarique possent. Quare non pauci e medio tollebantur. Notandum praeterea est, nonnullos hoc morbo affectos quarto vel quinto die non secus periisse, ac si gangraenosa pulmonum inflammatione suffocati essent. Alios post vehementis delirium morientes magnam saniei quantitatem per os, & nares reddidisse; & rubras antea maculas post mortem in quibusdam prorsus violaceas evasisse. Haec porro lues, in infantibus longe mitior, faciliusque remediis obtemperabat.

Et haec sunt scarlatinae nervosae observationes, quae methodum excitantem prorsus poseunt. Ab initio febris inflammatoria corripitur videbantur aegroti observationis I.; sed nimiarum evacuationum abusu debilitas directa accedebat, & tunc febris nervosa legitima insurgebat.

In observationibus II.; & III. scarlatina evidentiissime cum typho epidemice grassabat, quod nostro sub coelo rarissime contingit.

vini, camphorae, corticis peruviani, opii usu  
cessit, atque disparuit feliciter.

---

Quae de scarlatinae causis ferunt Scriptores quam-  
plurimi, ea tam cognita evadunt, ut non quidem ver-  
bum hic loci facere existimo. Unice mihi liceat KOR-  
TUM observationem Tyronibus tradere, quae non  
parum ad huius morbi historiam illustrandam confert,  
„ Quae scarlatinam febrim concitat, materiae morbi-  
„ dae insignis aptitudo inest, glandularum, in primis  
„ colli & salivarium tumores, iam in ipso febris de-  
„ cursu, generandi, & diu saepe post iam perpassae  
„ relinquendi. Cum anno 1787. epidemice saeviret fe-  
„ bris scarlatina, observabam in plurimis, potissimum  
„ adultis non febrim declaratam, sed glandularum col-  
„ li, parotidum &c. tumores phlegmaticos, & porro.  
„ — Quae vero post scarlatinam veram remanebant  
„ glandulosae tumescentiae, in plerisque casibus prorsus  
„ non scrophulosae fuisse, satis apparet, cum ex  
„ facili discussione, tum si forsitan in suppurationem  
„ transirent, ulceris facili & absque mora ut pluri-  
„ mum consolidatione, prorsus caeterum exulantibus  
„ cachexiae scrophulosae signis. Ex adultis foeminis  
„ frequentius quam viris tales glandularum tumores  
„ residuos molestos fuisse, observaverim. Nec non his-  
„ dem ii prae aliis mihi pati visi sunt, qui quondam  
„ affectibus scrophulosis laborabant, quibusque forsitan  
„ debilitas systematis glandulosi atque lymphatici super-  
„ erat. Neque prorsus dicerant, haud tamen frequen-  
„ tia exempla, ubi scarlatina pueros scrophulosos pre-  
„ hendens posteriorem hunc morbum auctum & exa-  
„ cerbatum relinqueret “.

Ex relatis nullum remanet dubium, vasa absor-  
bentia hoc in morbo affici. Qua de re Doct. BAVER  
nuper de scarlatinae morbo agens asseruit, verosimil-  
limum fore, miasma scrophulosum in chronicum &  
acutum discesci, atque ab acuto hoc exanthema nasci.

*Scarlatinae nervosae historia (a).*

Puella Papiensis, 17 annos nata, necdum menstruata, domicilium humidum incolens, per totam hiemem tussi, ac levi faucium phlogosi laboravit. Quindecim abhinc diebus febre prehensa est, quae nullo horrore praecedente, aegrotam ad noctem invadit, & sine comparente sudore derelinquit. Nunquam remediis usa, febre eadem ratione continuante, mane 30 Aprilis, cum febris esset solito fortior, ad Clinicum Institutum delata

D 4

---

Sab febris acuta, aliisque circumstantiis si scrophulosum virus in corpore lateat, ab irritatione febrili evolvitur, & evolutum in acutum miasma febris scarlatinae efformatur, quae diversa causarum indole, nunc mitior, nunc malignior apparet, & medico plus, minusve spei eius curandae relinquit (BAVER *de scarlatina observationes & elemata quaedam. Wittebergae 1796. 4.<sup>o</sup>*). Verum quanti haec hypothetica opinio habenda sit, nemo est, qui physiologicis & pathologicis instructus eam persolvere possit. Observatione recta & fida caremus, quae BAVERI opinionem nobis confirmat, eaque deficiente monstruosa exoritur medicina. Curationis methodum, quod attinet, iam paucis exposuit clariss. Auctor, semperque medicus diatheseos qualitatē prospicere debet (*Editor*).

(a) Hanc exaravit D. Med. Doctor *Henr. DE COMBES* Lausan.

est. Mox scarlatina, per omne corpus extensa, elapsa tantum nocte exorta, miliaribus interspersa, in conspectum venit. Fauces quam maxime dolebant, rubebant, tumeabant, & impedita multum erat deglutitio. Calor cutis intensus, vomitus, diarrhoea, insignis cephalaea, sese manifestabant. De summa interim virium deiectione conquerebatur aegrotata. Linguam albo mucro obiectam, pulsum frequentem, sat plenum & mollem in sinistro carpo, paulo debiliorem vero in dextro, observavimus. Aberant tinnitus aurium, convulsiones, aliaque symptomata nervosa. Facile eruebatur, morbum scarlatinam esse; sed febris natura admodum obscura nobis videbatur. Decurrant nempe symptomata diathesin asthenicam unice satisque certe indicantia, & morbi causae nos nimis latebant. Falsa quidem est aegrotata, se aliquo tempore ante morbi accessionem, madefactam fuisse a linteis humidis, quae in capite gestaverat; consideratis interim aegrotantis puellae aetate florente, corporis habitu sat robusto, methodum antiphlogisticam caute tentari posse statuimus.

*Applicentur Nro. octo hirudines ad col-  
lum.*

*Bibat frigidum, utatur diæta vegetabili.*

*Vespere.*

Aegrotā peius se habebat. Alvum quinquies deposuerat. Valde auctum invenimus cutis calorem, & frequentiam pulsuum maiorem. Arteria enim 140 ictus in minuto primo exhibebat, & labii inferioris tremor observabatur. Caetera eodem modo se habebant. Nunc, ubi morbi natura magis patebat, ac inflammationem quidem subesse, sed a febre nervosa circumdatam, nullum supererat dubium; a priori methodo, excitantem amplectentes, mox recessimus.

*R. Decoñ. cort. peruv. uncias novem,  
Emuls. arab. uncias quatuor,  
Haust. narcot. unciam unam.*

*M.*

*Cap. omni hora unciam unam.*

*Porrigantur vini optimi unciae quatuor.  
Dentur quoque lactis vaccini, quem exoptat,  
librae duae. Utatur iusculis carneis.*

*Mane 1. Maii.*

Aliquantulum melius se habebat puella. Alvus saepe admodum soluta est. Parum dor-

mivit. Fauces dolebant adhuc; sed minus rubebant. Pulsus ut heri. Repetatur medicina, augeatur vero haustus narcoticus ad uncias tres.

*Bibat calide infusum chamomillae. Applicetur cataplasma ex mica panis, & lacte confectum circa collum.*

*Habeat iusculum cum ovis; & vini albi unciiis octo. Seponatur lac vaccinum.*

*Vespere.*

Calorem cutis magnum, pulsus elevatiores, fauces minus dolentes, atque miliaria magis albida invenimus. Alvum non deposuerat.

*Repet. medicina.*

*Potus excitans praescriptus est.*

*Mane 2.*

Bene dormivit per integram noctem, aliquomodo soporosa nunc erat aegrotata. Alvus clausa. Lingua & labia arida erant & flavescebant; dolebant adhuc fauces, minus vero tumeabant. Pulsus ut heri vespere.

*Rx. Decoñ. cort. peruv. uncias novem,  
Emuls. arab. uncias quatuor,  
Haust. narcot. unciam unam,  
Camph. ras. scrupulum unum.  
M.*

*Cap. ut supra.*

*R. Emuls. amygd. libras duas,  
Sacch. unciam dimidiã,  
Aq. cinnamom. uncias duas.  
M.*

*Cap. pro potu.*

*Viñus idem. Habeat vini malvatici uncias quatuor.*

*Vespere.*

Paulo melius se habuit aegrotã; pulsus ad 124 ictus redierat. Alvum non deposuit. Lingua erat arida. Repetatur medicina; applicetur rubefaciens ad collum.

*Mane 3.*

Minime noctu dormivit; sed anxia val-



de fuit. Miliaria fere disparuere. Arteria  
 108 iētus tantum edebat. Capitis dolor eva-  
 nuit. Lingua minus sicca. Labia ob aridita-  
 tem valde dolebant. Faucium dolor eadem vi  
 prosequabatur. Aegrotā cibos appetebat; vi-  
 num vero respuebat.

*R. Emuls. arab. uncias septem,  
 Aq. cinnamom. uncias tres,  
 Haust. narcot. unciam unam.  
 Capiat more solito. Potus excitans.*

*R. Decoñ. cort. peruv. uncias sex,  
 Camph. pauxillo spirit. vin. sol. drach-  
 mam unam.*

*M.*

*Dentur doses tales Nro. VI. pro toti-  
 dem enematibus.*

*Diaeta II. cum 4ta parte pulli.*

*Vespere.*

Eodem fere modo se habebat, alvum  
 quater deposuerat.

*Continuetur in medicamentis.*

*Mane 4.*

In melius res vergunt. Noctu haud quievit; alvum sexies deposuit. Cutis interim rubor imminutus; pulsus plenus, mollis, adhuc naturali frequentior. Cephalaea nulla. Dolor faucium nullus superest, & inflammationis vix aliqua vestigia observantur. Milia-ria prorsus disparuere. Incipit desquamatio ad faciem.

*Repetantur omnia, excepto clystere.*

*Vespere.*

Alvus bis mota. Desquamatio in facie continuat. Lingua humida. *Repetantur omnia.*

*Mane 5.*

Sat placide quievit, mutatio in melius manifestior. Pulsus vix naturali frequentior. Rubor & calor cutis fere evanuerunt. Fauces minime inflammatae. Brachium dextrum paulum tumet & admodum sensibile est redditum.

*R. Decoct. cort. peruv. uncias novem,  
Emuls. arab. uncias quatuor,  
Aq. cinnamom. uncias tres,  
Syrup. papav. unciam unam.*

*M.*

*Capiat ut supra.*

*Vespere.*

Nil novi.

*Continuet.*

*Mane 6.*

Parum quievit. Caetera bene procedebant. Desquamatio nunc ad collum extendebatur.

*Repetantur omnia. Suspendatur potus excitans.*

*Vespere.*

Nil novi, brachium vix amplius dolabat.

*Continuet.*

*Mane 7.*

Bene valebat. Continuabat desquamatio in facie & ad collum, nulla eius signa aderant in reliquo corpore, cutis sanum colorem iam recuperaverat.

*R. Decoñ. cort. peruviani uncias sex,  
Emuls. arab. uncias quatuor.  
M.*

*Capiat omni biberio uncias duas.*

*Mane 8.*

Perbene se habebat, convalescens, quod de die sequente quoque dicas.

*Mane 10.*

Ob frigus incaute susceptum ( quamvis monita, ut ab eodem sibi caveret ), aliqua iterum febris cum alvi profluvio suborta est.

*R. Decoñ. cort. peruv. uncias novem,  
Haust. narcot.,  
Synup. cort. aurant. ana unc. unam.  
M.*

*Mane 11.*

Omnia perbene procedebant; quare ad convalescentes missa aegrotæ, die 3 mensis nosocomium læta deseruit.



## C A P U T VI.

### *Diarrhoeae & Dysenteriae.*

**N**ON male forsitan fecissem, si diarrhoeas eas a se invicem seiunxissem, quae indolis sunt diversae, quaeque contrariam medendi rationem expostulant. Ne tamen nimis augerem capitulorum numerum, uno eodemque loco hunc morbum, uti & dysenteriam ipsam pertractanda statui. Si quae mea in rebus medicis esset auctoritas, diarrhoeas, morbosque universos, in duas omnino classes dividerem, & separarem, quarum una, cunctos, qui e *totius systematis*, altera, omnes, qui a *locali affectione* generantur, contineret, atque distinctis limitibus circumscriberet. Divisio haec, quanti momenti sit, vix dici potest, atque de ea persuasum me teneo, quod medicus, qui illam ignoret vel negligat, vel iutam

justam satis diagnosin, vel certam prognosin formare vix queat. Diarrhoea enim illa, quae ex totius systematis labefactione originem ducit, a causis super integram machinam agentibus producit, atque ut plurimum remediis illis, quae universum systema afficiunt, tollitur. Diarrhoea contra, cui locale quoddam vitium ansam dedit, auxilio locali indiget, si vero hoc ipsum non ferat, ab arte sanari haud potest. Qua de re, antequam ego diarrhoeam, vel morbum alium quemcunque curandum aggrediar, constanter prae omnibus statuendum mihi censeo, morbusne sit *communis*, vel quod idem sonat, *universalis*, vel *localem* an indolem teneat? Quando igitur, instituto examine, aegritudinem ex totius systematis vicio natam esse constat; protinus alteram duplicem quaestionem instituere pro more habeo; an scilicet morbus inflammatorius (*sthenicus*) sit, aut an nervosus (*asthenicus*) & dein, an vires vitales valde auctae, depressaeve iudicari debeant? Contrario demum casu, id est, cognita *locali* aegritudinis natura, sedulo semper examinare consuevi: utrum morbum iam ab initio talis fuerit, vel cursu temporis, affectione communi neglecta, aut male curata, sit ortus? Sedem mali denique, ac eiusdem effectus, clare atque maiori studio determinare, duce inprimis

*Pars II.*

E

mis eximio MORGAGNI (a) opere, attentus sum (\*).

(a) *De sedibus & causis morborum.*

(\*) Innumerae causae diarrhoeam excitantes, occurrunt. Medici enim, qui in causas morborum attentius inquirunt, qui victus animalis & vegetabilis differentiam, potus aquosi, frigidi & calidi, nec non spirituosae varietatem, ipsasque alimentorum & potulentorum praeparationes & effectus, in corpore inde oriundos, studiosius examinant, de *opportunitate* ad diarrhoeam vel dysenteriam facile certiores reddentur, morbumque simul bene tractabunt. Si nullum existat in intestinis, vel in abdomine, organicum vitium, cuius historias apud LIEUTAUDIUM & MORGAGNIUM invenire quisquis potest, ad vivendi, ut dixi, genus aegrotanti familiare, medicus suam vertet attentionem, viresque stomachi, intestinorumque, nec non qualitatem diatheseos in universo corpore regnantem sedulo examinabit. Nimis prolixus forem, si universa diatheseos tum sthenicae tum asthenicae signa hic loci referre vellem. Hodierno artis medicae studio haec unicuique Tyroni innotescunt, supervacaneumque existimo hoc de argumento fusius agere, praesertim quod hoc instituti mei ratio non exoptulat. Sufficiet itaque, si ad examen *opportunitatis* ad diarrhoeam, vel ad dysenteriam & laxitatem intestinorum cum saburra puitosa, & siccitatem eorundem, cum scybalis duris & immobilibus coniunctam referam, quibus praesentibus alimentosae etiam substantiae diarrhoeam gignere possunt. Sed laxitatem & siccitatem intestinorum diatheseos regnantis effectus utplurimum esse, quotidiana docet experientia. Quae vero ex fluxus intestinalis opportunitate, diarrhoeam ipsam, vel dysenteriam gignente, paucis dicam. In laxitate intestinorum nostro nunc tempore adeo frequenti, & hisce diebus per Ticini urbem & vicina epidemice fere grassanti, ad potum aquosum ex so-

Clinicum Institutum aegrotantes tres cum diarrhoea, a totius systematis debilitate orta,

E 2

lis radis nimis calefactum, vel, in divitum ordine, ad potum aquosum nimis gelidum, qui magna copia ingurgitatur, praecipue respiciendum est: eodem enim stimulatorum actio augetur in illis, imminuitur in istis; fibrae relaxantur, digestio depravatur, omnesque corporis humani functiones plus minusve invertuntur. Exoritur hinc in primis ad debilitatem indirectam, in alteris ad debilitatem directam proclivitas, quae tandem accedit, si causae iam relatae non arcentur. Altera dispositio morbosa, praecedenti ex parte contraria, est siccitas intestinorum, quae quidem, dum scybala dura & exsueca reddit, magis ad obstructions alvinas disponit, quibus saepe homines in sano de reliquo statu male afficiuntur, variisque vitae incommodis vexantur, in morbis vero, & in primis in febribus, maxime anguntur. Naturalis motus peristaltici lentior in crassis intestinis hinc remorae prae aliis favet: cum enim digesta alimenta lentius exsugenda essent, quo omnis materia, nutritioni apta, inde educeretur, & a vasis bibulis resorberetur, viae longitudo & lentior motus omnino requiri videbantur, quibus tamen remora excrementorum nonnunquam inducitur. Porro & coeci intestini situs, & zonae coli tractus satis declarant, scybala exsiccata non nisi viribus auctis ulterius urgeri posse, quae vires ab abdominalibus musculis & diaphragmate potissimum expectandae, saepius & praecipue in vita sedentaria deficiunt. Tandem & coli fabricae attendendum est; in hoc enim intestino cavernulae in interstitiis ligamentorum canalem firmantium effictae, ipsis faecibus remoram concedunt, per quam exsiccantur ita, ut non raro liquida excrementa per hunc canalem transire possint, crassioribus aliis a latere relictis. Cum vero ea ratione moles scybalorum augea-



ingressi sunt; quorum historias lubens praeterco, quum parum, aut nihil attentione dignum subministrant, neque Lectoribus difficile esse putem, methodum, qua sanati sunt, vel sponte perspicere, si eorum, quae de februm nervosarum curatione dixi, meminerint. De illis hinc aegrotantibus solummodo, qui alvi profluvio, a vitio quoddam locali ortum trahente cruciabantur, mentionem nunc

---

tur, stimulo & pondere saepius molesta fit, humores etiam ad canalem alimentorum allicit, & in corpore aegroti, utpote magis sensibili, tensiones abdominis, tumores hypochondriorum producit, saburram copiosam subito movet, & diarrhoeam molestant concitat. Ex hac causa tumores steatomatosos intestinorum praecipue oriri censeo, qui diarrhoeae nullis subditiis coercendae & toto vitae curriculo sociae, originem praebent. Sed altera adest diarrhoeae causa, quae saepe saepius in hominibus vel foeminis irritabilibus locum habet. Quantum imperium animi pathemata in totum corpus humanum, nervorum ope, exercent, nemo est, qui inficiabitur. Ab aliis quam maxime acceleratur oculi nictu citius sanguinis circulatio, hinc perperam excitantia vocari solent gaudium, amor, ira &c. Experientia enim notum est, quod pro variis hisce animi pathematibus, a diarrhoea suborta mox salubres, mox funestii observari soleant effectus. Sic diarrhoea irae si supervenit, bonum esse saepius observavit BAGLIVIVS. Plures huius generis observationes reperiuntur apud VALLE (*Saggio sulle malattie croniche. Pavia 1792. 8.<sup>o</sup>*). Millenas numerat SAUVAGESIUS diarrhoeae causas, verum quamplures tanquam diatheseos effectus medicus sagacissimus eas facillime respiciet. (*Editor*).

iniiciam, ut quorum duos tantum suscepimus. Ex his unum, utpote incurabilem, ne lectulum, Iuvenum institutioni dicatum, nimis diu occuparet, ad suos mandavimus; alterum vero, quippe morti proximum, retinuimus. En eiusdem morbi historiam, adiecta simul cada-veris sectione.

*Diarrhoeae ex locali affectione historia.*

*Ioannes Antonius Cassinera*, agricola, per viginti quinque vitae annos nulla se unquam morbosa affectione correptum fuisse, refert. At vigesimo sexto, post continuos labores a febre correptus fuit, nunc per aliquot dies silente, nunc rursus insurgente. Haec per annum & amplius, nullo interim ordine observato, pertinaciter duravit. Accesserat iam a morbi initio magna admodum diarrhoea, quae tamen minime cum febre siluit, sed per biennium, minimis temporis spatiis interpositis, quietem concedens, aegrotantis vires magis magisque infregit. Quem statum morbosum a rusticis laboribus continuis repetens aeger, hisce omnino valedixit, & octo ante annos, peiori adhuc consilio, hac in urbe operam suam dedit colorum tractationi in officina, in qua vasa ex argilla construuntur. Haec loci vitaeque generis diversitas nullam induxit in

aegri corporis mutationem, quae scilicet hanc ad diarrhoeam proclivitatem tolleret. Idem hinc fluxus eadem ratione continuabat. Nihilominus a tribus iam mensibus de sua salute minime conquerebatur, cum fluxus nunc suppressi videretur; immo aliqua alvi durities successisset. Paucis vero abhinc diebus, insolita quaedam corporis lassitudo, ac fastidium laboris sese prodiderunt, in quorum rationem ipsemet aeger frustra inquirebat. Tandem die 23 Februarii, ad vespertas, intensum frigus insurgit, integram per noctem continuatum, cui calor succedit, vi aegrum aequali afficiens. A primo iam istorum ingressu, consuetus aegro fluxus rediit, sub quo faeces liquidae, flavescentes, non sanguineae, vigefies & ultra per diem, aliquibus cum abdominis torminibus, non tamen continuis, & absque tenesmo emittebantur. Haec omnia per tres dies continuant, immo exacerbantur, quibus peractis, nosocomio mane 26 Februarii committitur aeger, ubi decoctum corticis peruviani, cum extracto corticis eiusdem, & laudani liquidi SYDENHAMI guttae XXX. porriguntur. Ad vespertas vero nostris observationibus traditus sequentia exhibet adnotanda. Febris continuat cum pulsu exiguo & frequente, cutis calor naturali maior, carnes laxae cum aliqua cutis ficcitate, debilitas magna, facies

pallet, oculi languent, genae collapsae, capitis dolor urget, deest aurium tinnitus. Aeger conqueritur etiam de oris amarore, de summa ciborum aversione, & nausea, absque vomitu. Lingua albo muco oblecta est, ac sitis, aqua frigida minime sedanda, miserum molestat. Abdomen non omnino tractabile, sub attactu tamen non dolet. Dolores hinc inde perſentit aeger, praecipue faecum excretionem appropinquante. Alvi fluxus absque tenesmo continuatur.

Causae huius morbi ex ipsius aegri confessione sunt; assidui labores antehac peracti, nunc cum vita sedentaria commutati, habitatio frigida ac humida, victus vegetabilis, tenuis, vini fere defectus, ac plumbi vapores. Difficile nobis erat mox huius morbi, discrimine pleni, diagnosin pronunciare. Febris videbatur nervosae indolis esse, saltem sic docebant causae, quae illam produserant, atque aegrotantis constitutio. Diarrhoea vero, quum ipsa iam ab undecim fere annis persistat, probabilis ratione a vitio quodam locali, haud facile determinando, originem trahit, immo ipsa febris forsitan eiusdem effectum constituit. Ne tamen aegrotus, omnibus auxiliis destitutus sibi ipsi committeretur, atque ut vita, quantum id per nos liceret, servaretur diutius, doloremque minueretur intensitas, sequentem methodum arripuimus.

*Rx. Decoñ. cort. peruv. uncias novem.*

*Emuls. arab.*

*Hausß. narcot. ana uncias duas.*

*M.*

*Capiat omni hora unciam unam.*

*Potus excitans.*

*Alimenta ex iusculis carneis, ovis, ac vini optimi libra una sunt.*

*Mane 27.*

Nox, alias ob dolores valde inquieta, placida fuit. Vix quater alvum deposuit, dolores abdominis sub faecum evacuatione imminuti, pulsus elevationes, sed adhuc frequentes, capitis dolor minor, caetera symptomata mitius continuant.

*Repetatur medicina, cui addé,*

*Extrañ. cort. peruv. unciam dimidiam.*

*Diaeta eadem, cum vini libris duabus.*

*Vespere.*

Quater alvum deposuit, cruciatus abdo-

minis disparuerunt; pulsus frequentes & clatiores conservantur; sitis continuat; caetera symptomata meliora fiunt; ingratam sensationem ad ventriculi regionem post assumptum aut cibum, aut ingestam medicinam accusat, ab aqua tussis hinc inde excitatur.

*Repetatur medicina. Augeatur haustus narcoticus ad uncias quatuor.*

*Mane 28.*

Nox inquieta, sexies alvum deposuit, dolores abdominis non persentiuntur, sed continuat ponderis sensus ad scrobiculum cordis, dolorem non exiguum aliquando excitans. Tussis frequentius renovatur, sub qua materies flava evomitur.

*Repetantur medicina, aliaque.*

*Vespere.*

Eodem modo res incedit. Alvus sexies laxata.

*Repetantur omnia.*

*Mane 1. Martii.*

Res in peius ruunt. Pulsus parvi, fre-

quentes. Oppressionis sensus ad scrobiculum cordis continuat, qui sub tussi in dolorem vertitur. Bis sub ipsa tussi, amara acida, ac viridescencia vomitu reiecit. Diarrhoea continuat. Ructus foetentes, putridi, tremores artuum, atque horripilationes miserum cruciant.

*Rx. Emuls. arab. uncias septem,  
Haust. narcot. uncias tres,  
Mosch. opt. scrupulum unum.*

*M.*

*Capiat omni quadrante horae unciam unam. Habeat vini malvatici uncias septem. Applicentur duo rubefacientia ad brachia.*

*Vespere.*

Per totam diem nunc vomitus, nunc alvi deiectio aegrotum vexarunt, anxietas augetur, pondus ad ventriculum continuat. Ab attactu abdomen nunc aliquomodo dolore afficitur. Facies hippocratica, corpus indecore per lectum iactatur.

*Rx. Mosch. opt. grana quatuor.  
Fiat cum extract. cort. peruv. s. q.  
bolus.*

*Dentur doses tales Nro. X: Capiat omni  
hora unam.*

*Iniiciatur omni bikhorio clyster ex cam-  
phora & emulsione arabica.*

Versus dimidiam noctem, sub vomitu  
& stertore, vivere cessavit.

*Cadaveris scđib.*

Aperto abdomine, *vesica* urinaria appa-  
ret distenta, ad regionem umbilici usque  
perveniens, quin unquam in morbi decursu  
suspicio insurgeret de urinae retentione, quum  
neque difficultatem in eadem emittenda accu-  
saret aegrotus, neque dolores ad vesicae re-  
gionem persentiret, neque tumor ad hypoga-  
strium appareret, qui vesicae praeternaturalem  
distensionem ostenderet. Superficies interna at-  
que externa vesicae nullum inflammationis, vel  
gangraenae signum ostendit.

*Intestina* tum *tenuia*, tum *crassa* exte-  
rius naturalem colorem servant; *omentum* ma-  
gnum, sed sanum; *ventriculus* exterius magni-  
tudinem naturalem, & colorem ostendit, *lien*  
parvus; *hepar* magnum, aliquibus in locis ita  
laxum ac friabile, ut vix manibus contracta-



tum, disrumperetur; *cystis fellea* bile repleta, absque calculis. Aperto ventriculo cum intestinis tenuibus, nec inflammationem, gangraenae vestigia hic loci invenimus, a materia ex flavo-viridescente intestinorum superficiem internam obductam conspeximus. *Caecum*, colon ascendens atque transversum, vix a naturali statu aberrant. *Colon* descendens appendicibus oblongis, complanatis, ex sebacea materia compositis, undique obvallatum, qui appendices magis magisque adaugentur tum numero, tum magnitudine, quo magis colon ad rectum appropinquatur. Intestinum vero rectum a crasso ac duro steatomate circumdatur, quod inferiorem pelvis locum tenens, vesicam superiorem in partem coegit. Adeo vero rectum intestinum ab hoc maximo tumore comprimebatur, ut lumen illius calamus scriptorium vix admitteret (\*).

In thorace omnia secundum naturam.

Ioan. NICOLINI *Mediolanensis*.  
M. D.

---

(\*) Apud LIEUTAUDIUM, & praecipue apud MORGAGNIUM ( *De causis & sedibus morborum &c. Epistola XXXI.* ) multa huius generis referuntur exempla, ex quibus nonnulla consideratu dignissima ( *Edit.* ).

Quatuor aegrotantes, dysenteria affecti, in Instituto Clinico pertractandi mihi obven-  
runt: qui singuli maxima cum celeritate sa-  
nitati restituti fuerunt. Etsi quidem certus  
sim, dysenteriam non semper eiusdem esse in-  
dolis, atque hinc inde antiphlogistica auxilia  
exposcere, nihilominus quisque mecum fatea-  
tur necesse est, febrem, quae ipsam comita-  
tur, uplurimum naturae nervosae esse (\*).  
Causae enim, quae dysenteriam procreare so-  
lent, vix non omnes debilitando agunt; atque  
symptomata; quae dirus hicce morbus ob  
oculos ponit, principii vitalis labefactionem  
ultra demonstrant. Inter horum symptomatum  
cohorem, signa gastrica sic dicta primum  
fere locum tenent: qua de causa non pauci  
medicorum ad evacuantia confugiunt, quae  
certe & hoc in morbo non raro exitialia sunt.  
Infelix experientia hanc sententiam nimis com-  
probat. A sano iudicio sine dubio alienum  
est, curationem alvi profluvii, quod in dy-

---

(\*) Dysenteriae phlogisticae, seu cum febris inflam-  
matoriae exempla nonnulla in hominibus bene passis  
hoc anno habui, & methodo prorsus antiphlogistica in  
usum vocata, celeriter aegrotantes ad convalescentiam  
restitui. Caeterum dysenteria phlogistica non tam rara  
est, uti opinatur, saltem sub morbi initio: tractu vero  
temporis sub repetitis evacuationibus dysenteria in ner-  
vosam mutatur ( *Editor.* ).

senteria nervosa insignem totius machinae debilitatem procreat, cum remediis purgantibus aggredi, quae, debilitati debilitatem addendo, aegrotos ad orcum celeri passu conducunt. Quodsi medici considerarent, aegrotos vix non constanter ante ingressum dysenteriae, cibos minus solito, apparet, immo ipsos fere semper adversari; si ingentem copiam humorum ac sanguinis, quae sub adeo repetitis, licet parum copiosis deiectionibus, amittitur, rite animo perpenderent; tunc certe non tam facile huius morbi originem, vix non ubique in colluvie gastrica quaerere, neque superflitam vitae partem emeticis, atque catharticiis dilapidarent. Adde, quod, cum dysenteria saepe saepius comitem sic dictam febrem putridam agnoscat, vel, ut melius loquar, quum ipsa dysenteria frequentius nil aliud sit quam febris nervosa, cui alvi profluvium sese adsociavit; iidem prorsus errores, qui in typho circa victus rationem committuntur; isthoc quoque in morbo locum inveniant. Dysentericis hinc animam agentibus, a non paucis practicis iuscula carnea, ova aliaque ex regno animali petita alimenta serio prohibentur, concessis contra lubenter fructibus horracis, subacidis, caeterisque sic dictis antisepticis, quae singula, testante quotidiana experientia, ad promovendam potius dysenteriam, quam ad reprimendam plerumque valent.

Ego vero hunc morbum, dummodo non inflammatorium, methodo contra febres nervosas commendata, pertractare soleo. *Opium* hac in morbi specie a SYDENHAMO, RAMAZZINI aliisque tanto cum successu adhibitum, caeteris remediis singulis anteponendum arbitror. *Emulsionem* vero *arabicam* eisdem superaddo, quae intestinis adeo sensibilibus, atque stimulo perferendo tam imparibus, quam maxime conducit. Necesse interim est, opium cum aliis pharmacis, actione minus fugaci praeditis, coniungi. Neglecta enim hac regula, breve levamen obtineas: quum paulo post fluxus dysentericus nova, immo maiori vi, prorumpat. Methodus ista tanta felicitate nuper a celeb. Professore Antonio SCARPA in duobus aegris, qui in Instituto Clinico chirurgico degebant, adhibita est, ut gravissimam dysenteriam quadraginta horarum spatio penitus depelleret. Ego ipse in nosocomio Ticinensi, aestate ac autumno vix elapsis, magnum dysentericorum graviter aegrotantium numerum, tanto cum successu, ac peculiari felicitate pertractavi, ut nec unum quidem ex iisdem amiserim. Ibidem tunc temporis aegroti curationem suscepi, qui praeter consuetam dysenteriae symptomata, frigore extremitatum, vomitu, atque singultu cruciabatur. Exhibito moscho ad grana centum.

octoginta in die, simul cum opio, porrecto vino, ac concessis iusculis carnis, aegrotus decem dierum spatio a dysenteria liberatus fuit. Per mensem tamen febris quaedam lenta nervosa remansit, quae demum quoque, sub remedium excitantium usu, integre disparuit (\*).

Aegroti, qui hoc anno scholastico in Clinicum dysenteriae laborantes suscepti fuere: certe non tam graviter decumbebant, ac illi, de quibus modo locutus sum. Quare unicam historiam attulisse sufficiet.

## HI-

---

(\*) Praeter moschum, opium, aliaque remedia excitantia, maximam ex decocto saturo simarubae utilitatem pluries obtinui. Caveant tamen medici ex nimio stimulantium usu, cuius actio maiorem aegrotantibus noxam inferre potest. Si dolores acuti atque tenesmus vexent, admoveantur clysmata ex remediis leniter stimulantibus composita. Emulsio arabica cum decocti corticis peruviani leviori dosi, vel herba malvae, altheae, flores sambuci, chamomillae in lacte simul cocti, admixta portione olei vel liliorum alborum, vel olei chamomillae, vel tincturae thebaicae hic saepe conducunt. Eiusdem generis fomenta ventri applicentur. Finito morbo primae viae roborandae extracto corticis aurantiqum, vel gentianae, vel trifolii &c. Infusum corticis china-chinae, castarillae cum aqua cinnamomi &c. etiam continuandum, donec intestinis & stomacho pristinus reddatur vigor (*Edinr.*).

## HISTORIA.

Vir triginta circiter annorum, aegrotantium custodis in Clinico Chirurgico munus exercens, iam octo abhinc diebus incepit faeces solito liquidiores deponere. Brevis temporis spatio praeterlapso, fluxus iste adeo augetur, ut omnia fere dysenteriae symptomata ostenderet. Faeces enim saepissime, pauca copia, quotidie deponit cum tenesmo, ac abdominis diris cruciatibus; materiae per alvum evacuatæ cruori non sunt mixtae. Sexta huius morbi die, accessit quoque febris ad hanc usque horam perdurans, qua in Clinicum Institutum se deferri curavit aeger, & sequentia manifestavit. Aderant, praeter iam enarrata, cephalaea, oris amaror, appetitus deiectus, calor cutis auctus, ac pulsus debiles, atque frequentes. Causae morbi huius videbantur esse vigiliae, frigus nocturno tempore admissum, & forsitan contagium. Omnibus rite perpenfis, morbum pro dysenteria nervosa leviori declaravimus, ac sequentia praescripsimus.

*Mane 13. Maii,*

*R. Decodi corticis peruv. uncias novem;  
Emulsions arabicae uncias quatuor,  
Haustus narcotici uncias duas. M.*

*Pars II.*

*F*

*Cap. omni hora unciam unam.*

*Illiniatur cum linimento volatili abdomen.*

*Diaeta III. cum vini libris duabus.*

*Mane 19.*

Duodecies elapsa nocte alvum deposuit cum tenesmo, ac diris abdominis cruciatibus. Febris aucta, pulsus frequentiores, ac pleniores.

*Repetatur medicina, cui adde:*

*Extrañ. corticis peruv. drachmas duas.  
Auge quoque haustum narcoticum ad  
uncias tres.*

*Repet. caetera.*

*Vespere.*

Pulsus, & cutis calorem fere naturales invenimus. Semel tantum alvum deposuit. Ventris dolores imminuti fuere.

*Repet. omnia.*

*Mane 20.*

Convalescentem dicere possumus aegrotantem. Nulla cephalaea, appetitus viger, lingua nitida, os non amplius amarum, alvus semel aperta, uno verbo disparuit morbus. Manfit adhac per quinque dies in Clinico Instituto; ac dein prorsus a morbo restitutus, domum petiit suam.

*Amat. BUZZI Novocomensis.*







## C A P U T VII.

### *Uteri haemorrhagiae.*

**S**I aegrotum haemoptoicum, alterumque miſtu cruento affectum, quorum historiae nil memoratu dignum continent, excipiam; nullae aliae haemorrhagiae, praeter quinque menorrhaeas, hoc in Clinico Instituto pertractatae fuere. Cum vero morborum, a quibus quinque illae foeminae afficiebantur, historiae paulo longiores sint, silentio illas praeterire mihi liceat. Duae ex istis, aegrotantes prorsus sanatae domum petierunt, reliquas vero tres, longe meliori sub rerum statu, e Clinico, ob morbi nimiam durationem, dimisimus.

Antequam menorrhaeae curationem inciperem, constanter binas illas quaestiones, uti caeteris in casibus, ita in hac quoque morbi specie, mihi ipsi proponendas esse arbitratus sum, scilicet: num morbus *universalis*, vel *localis* sit? Primo in casu, sedulo, an stheni-

cam, aut asthenicam diathesin ostendat, examinavi? Ubi localem menorrhæa causam, in vitio organico, agnoscit, vix ea, aut ne vix quidem sanari potest. Tunc enim integra curatio in vitio locali auferendo consistit, id quod sæpissime medicam scientiam, artemque omnem prorsus superat. Qui rebus ita sese habentibus, curam mali remediis internis susciperet medicus, incassum ille, immo non sine aegrotantis damno, id faceret. Scio tamen, a nonnullis practicis in menorrhæa a causâ locali nata, per integros annos sic dicta remedia adstringentia præscripta fuisse: ignorabant enim, hic omnem ab auxiliis topicis curationem expectari debere. Alio longe modo morbus hic pertractandus est, cum a totius systematis labefactione propullulat. Hoc in casu auxilia topica vix pro momento levamen afferunt, quod magis constans, ope remedium, quæ in corpus universum agunt, longeque certius obtineas. Solemnis est CULLENII (a) divisio menorrhææ in *activam* & *passivam*, atque medico practico pernecessaria. Fateri tamen oportet, uteri hæmorrhagias activas, si quasdam ex acutis excipias,

---

(a) Nosolog.

esse avem rarissimam. Foeminae enim, quae huic morbo subiiciuntur, tam longe absunt a virium vitalium superabundantia, ut contra fere omnia debilitatis signa observatoribus offerant. Sanguinis ex utero fluxus chronicus fere constanter a totius systematis imbecillitate praemagna annūciatur: ei praecedit anorexia, quae facit, ut miserae aegre cibum assumant, & assumptum male subigant. Accedunt pulsus ut plurimum frequentes ac parvi, debilitatis testes. Causae ipsae, quae hunc morbum generant, vires corporis fere singulae imminuere solent. Neque enim habitatione humida, ciborum inopia, pathematibus animi deprimentibus, spirituosorum defectu, aliisque similibus, vim vitalem, erit qui dicet, augeri. Minime integram ignoro, menorrhoeam saepe saepius a causis maximo cum stimulo agentibus produci, quae tamen observatio sententiam allatam haud infringit. Constat enim stimulos, qui summa cum intensione agunt, debilitatem generare. Sic ciborum nimia copia ventriculi corporisque vires eadem ratione, qua illorum inopia, frangit; calorque nimius, aequè ac frigus, summam debilitatem, immo ipsam adeo grangraenam adducit. Idem de nimio motu, quiete, animique pathematibus dicas. Ira levis vim musculorum, animique energiam manifesto auget; deprimit con-

tra quammaxime ira vehemens, quae tot homines ob haemorrhagiam subsequentem morti dedit. A plethora igitur ac virium vitalium superabundantia rarissime haemorrhagias uteri produci, pro certo habeo. Nimiam sanguinis copiam tamen interdum menorrhoeam generare posse, concedam: quum vasa ultra modum illa distendat & ob stimulum, praegrandem laxitatem in istis producat. Sthenicas quoque interdum esse haemorrhagias, hoc illorum in phlogoses transitus, evidenter docet. Sed responderi mihi velim quaerenti, an mansura sit adhucdum, elapso mense, plethora seu sthenica illa diathesis, postquam scilicet aegrotata maximam iam primis morbi diebus sanguinis amiserit copiam? An superites sit eadem, quum medicus, uti mos est, venaesectiões tot instituerit, quot mihi quidem ad plures peripneumonias sanandas sufficerent? An reliqua esse haec cruoris copia possit; si aegrotata uti e more est vulgo medicorum, vegetabilibus iubeatur vesci, quae sanguinis copiam parum augere valent? Ego quidem lubens fateor, me nullo modo hucusque intelligere potuisse, quamnam sanguinis officinam statuunt medici, qui in hisce morbis de plethora cogitant. Quod de menorrhoea dixi, idem omnino de reliquis haemorrhagijs quoque valet.

Pauca nunc de medendi methodo, quam contra haemorrhagias, & praesertim contra menorrhoeam adhibuerim. Quando sanguis ob nimium stimulum, ac ob machinae animalis vires superabundantes ex aliqua parte stillat, tum certe & ego antiphlogistica remedia, excepta tamen venae sectione (in illis saltem haemorrhagiis, quae pulmones, ac viscera interna alia haud respiciunt), in usum vocare soleo. Neque enim ulla res magis contraria & a sano iudicio aliena mihi videtur, quam sanguinis fluxum, ubi ex eius in partes vicinas egressu ac stagnatione timendum nihil est, artificiali cruoris evacuatione sanare velle. Nam, si haemorrhagia a plethora revera pendet, sine, quaeso, ut, sub dicta restrictione, nimia sanguinis copia effluat! Quo facto, cessabit sua sponte fluxus, quum effectus sub lata causa constanter tollatur. At si cruoris iactura a debilitate pendet, quis, venae sectionem aut ominosam, aut internecinam esse debere, non videt?

Quinque foeminas, quae haemorrhagia uteri affectae apud nos degebant, cum methodo excitante pertractavi, quum morbus nec a causa locali, nec a diathesi phlogistica, oriatur. Hinc iisdem remediis sum usus, quae contra febres nervosas, commendavi. Initante periculo, sub ipso sanguinis fluxu, *opium*,

*moschum, aetherem*, aliaque huius naturae remedia praescripti. Imminuto ab illis discrimine, ac profligata haemorrhagia, mox ad pharmaca minus vehementer stimulantia, sed quae vim permanentem possident, progressus sum; nempe ad peruvianum corticem, ad martialia &c. Omnem fidem praeter haec auxilia in victum animale, atque in vini modicum usum reposui.

In nullius morbi curatione interim tam caute remedia excitantia praescribenda sunt, quam in haemorrhagiis. Corpus enim, quod plurimum sanguinis amisit, valde sensibile. vel alio verbo, excitabile est. Hac de causa parum stimuli recipit, & a maiore obruitur. Excitantia itaque minima dosi, unica vice porrecta, salutarem actionem facilius edunt, ac causam morbi, debilitatem scilicet, tollunt. Si vero magna copia remedia huius indolis porrigantur, contrarius prorsus effectus sequitur: debilitas nimirum augetur; ac nova, vix sedanda, haemorrhagia in conspectum prodit (\*).

---

(\*) Praeter menorrhagiarum divisionem in *activas* & *passivas*, altera sequitur divisio, quam Medicus magni facere debet. Sanguinis ex utero profluvium cum detrimento sanitatis coniunctum omni quovis tempore ac vitae aetate evenire potest: verum frequentius in foeminae sequentes notantur species: *menstrua nimia*, *hae-*

Hoc loco necesse est, ut difficultatem circa *martialia* in morbo, de quo agitur,

*morrhagia uteri tempore graviditatis, haemorrhagia uteri sub partu, haemorrhagia uteri post partum.* Non facile medicus determinare potest copiam sanguinis naturalis, quae per menstrua excernitur. Maiori copia ad libram & ultra in regionibus calidis, in frigidis vero ab unciiis tribus ad uncias sex fluere, tradidit summus HAL-LERUS. Plus sanguinis amittunt foeminae laete vi-ventes, vitam sedentariam, otiosam degentes, libidi-nosae, & quibus corporis habitus gracilis est; minus vero quae corpus magis exercent, & durioris uteri sunt. Plurium Auctorum sententias de copia mensium naturali differentes, hic asserere supervacaneum censeo. Plerumque a tribus ad sex & octo dies menses fluint. Dantur vero exempla, uti extat apud GULBRAND, foeminarum, quibus singuli fluxus uteri cruenti periodi decimoquarto quovis die, vel citius redeunt, sine ulla sanitatis laesione. Ex relatis facile intelligitur, non ex sanguinis amissi quantitate de uteri haemorrhagia diu-dicandum fore. Unica symptomata sanguinis effluxum concomitantia perpendenda sunt, & ex his diagnosis efformanda. Nimia hinc menstrua erunt, & haemor-rhagiae uteri nomen affument, si ab eorum excretionē sanitas detrimentum capiat, functionesque vitae neces-sariae magis, minusve laedantur. — De haemorrhagia uteri graviditatis tempore, sub partu, & post partum differere hic locus non est; nonnulla tantummodo affe-ram, quae omnibus harum haemorrhagiarum specie-bus communia videntur. Omne sanguinis profluvium ex genitalibus plerumque sequentes in aegrotante edit effectus. Iuxta profluvii maiorem, vel minorem ve-hementiam totius corporis debilitas maior, vel minor: pallor faciei, extremorum frigus: circulatio languens: pulsus parvus, debilis, tardus, nonnunquam intermit-tens: anhelatio, anxietas, animi deliquium, lipothy-

adhibenda, aliquando mihi ab aliis obiectam paucis diluam. Qua ratione tu quidem, inquirunt, in haemorrhagia uteri, martialia prae-

mia, convulsio, tandem mors. Appetitus prosteritur, digestio, chylicatio & nutritio depravantur, inducitur exinde mox cachexia, generantur viscerum obstructions, corpus consumitur, tument pedes, & denique aut tabes, aut hydrops vitae finem faciunt. Quo frequentior uteri haemorrhagia, eo maior fit ad eam dispositio, cuius rei veritatem frequenter satis superque insaulta experientia probavit. Saepius quoque accidit, ut illa uteri debilitas partialis, fluori albo pertinacissimo occasionem dederit. Uteri profluvii sanguineis praedispofitae sunt foeminae, quae habitu corporis tenero, nervoso, systemate debili, incitabilitate magna praeditae sunt. Haec omnia vero luce meridiana clarius ostendunt, debilitatem directam hac in affectione ut plurimum locum habere: hinc recte Samuel LYNCH in Tabula morborum principiis BRUNONIS digestorum (Vid. *Biblioteca medica Browniana publicata dal Dott. Luigi FRANK Volume II.*) eam sub morborum ordine reduxit, in quo incitabilitatis gradus 55., stimulorumque vero 25 tantummodo sunt. Quo ad saluberrima hoc in profluvio uterino cruento eligenda remedia, iam praecepta a clar. Auctore nostro supra indicata valent; nempe excitantibus minima dosi porrectis pristina reditur salus. Vitanda hic sunt, quae nimis irritant, uti spirituosae & aromaticae. Aër aegram circumdans temperatus sit; stragulis levioribus utatur, & vestimentis solvatur infelix. Ab omni vociferatione abtineatur oportet. Resupinanda foemina, & ut nonnulli volunt cum pelvi elevata: suae enim horizontalis vires languescunt optime sustentat, & sanguinis effluxum ex vulva impedit, dum trombi generantur, & via efluenti sanguini praecluditur (*Edit.*).



scriberes? bone Deus! Ignorasne forsitan virtute emenagoga martem pollere? Egregie sane in materiae medicae sic dicta studio versatos eiusmodi adversarios dixerim, qua scilicet in medicae scientiae parte, hanc usque in diem remediorum divisio plane absurda in *emenagoga*, in *expectorantia* &c. toleratur. Respondi facili negotio, me nulli pharmaco emenagogam vim tribuere, & confidenter asserui, martialia nunc uteri profluvium sanguineum promovere, quando sanguis ob debilitatem retinetur; nunc vero arcere, si eam ipsam ob causam nimia cruoris copia deperditur.

Alia difficultas, longe maioris momenti, ultimo loco solvenda superest. Quum de morborum phlogisticorum curatione verba facerem, ingenue me frigori debilitantem potentatem tribuere, declaravi. Contra hanc BRUNONIS sententiam novissimam, quae nuperime a celeb. WEICKARDO, nec non a me ipso, maioribus argumentis firmata fuit, nonnulli medici insurrexere. Argumentis, quae singuli afferunt, hoc loco respondere haud licet, quod quidem alia occasione iam fasius feci (a). Uni hic respondisse sufficiat. Si fri-

---

(a) JONES op. cit.

gus debilitaret ( aiunt BRUNONIS adversarii ), quomodo, ope glaciei iterum saepiusve haemorrhagiae *passivae* supprimerentur? Pro facto, frigus hasce haemorrhagias arcere, admittam, licet contrarium ego ipse viderim. In ex-monacha Ticinensi, magnum uteri profluvium cruentum, post balneorum frigidorum usum ortum esse observavi. Septem circiter abhinc annis *Epiclasis* in hoc ipso in Clinico Instituto vidi, qua aegrotans scorbuticus afficiebatur. Adhibita glacie, haemorrhagia quam maxime augebatur, mox vero sub remedium excitantium usu fiebat. Sed aliorum observationes sacrae sunt. Si in medio cursu, vel tripudia inter & saltationes ( dummodo diathesis sthenica necdum in debilitatem indirectam conversa sit ) oriatur haemorrhagia; facile est unicuique intelligere, frigus illam sedare posse; nullo alio tamen modo, quam superabundantiam stimuli imminuendo. Idem dicas de nimio calore, de vini abusu &c. Hae tamen observationes tantum absunt, ut roborantem frigoris vim comprobent, ut prorsus contrariam declarent. Quaestio igitur circa illas haemorrhagias unice se vertit, quae minime ab excessu stimuli, sed ab ipsius defectu generantur. Nam & in hoc casu, sunt, qui fomentationes frigidas suadeant; utrum bene? alia est quaestio. Sed finamus etiam hoc in

casu sanguinis fluxum , e debilitate nempe ortum , a frigore aliquando arceri : quidni ? Aliud enim est haemorrhagiam *pro momento sedare*, aliud *causam radicatus evellere*. Quotidiana experientia nos docuit , diras saepe haemorrhagias tunc solummodo filere , quando aeger in lipothymiam incidit . Phaenomenon hoc facile explicandum est . Non defuere hinc medici , pene dixerim carnifices , qui sub ipsa haemorrhagia effraeni , venae sectionis usum ad lipothymiam usque suaserint . Ita vero debilitati debilitatem addunt , morbiq; causam longe maiorem reddunt ; quae res facit , ut licet haemorrhagia abhinc compescatur , nemo tamen dicere possit , morbum esse sanatum , aut imminutum (\*). Iam idem cum

---

(\*) Eodem tempore , quo balnea gelida in haemorrhagiis praescribuntur , excitantibus remediis larga dosi utuntur plurimi Medici , sanitatemque glaciei actioni tantummodo tribuunt . Elapso anno dum Mediolani praxim medicam exercebam , ad foeminam iam ab octo diebus uteri profluvio sanguineo ex totius systematis debilitate exorto laborantem , vocatus fui , ibique peculiarem medendi methodum observare potui . Venae sectio per sex vices repetita fuit ; glacie puro bis in die totum abdomen obregebatur , & omni bihorio mixturae , ex unciiis quatuor decocti corticis peruviani , unciiis duabus tincturae cinnamomi , scrupulis duobus liquoris anodyni , scrupulo uno laudani liquidi , uncia una electuarii diascordii , & unciiis duobus aquae menthae , factae , co-

frigoris usu, quod longe tamen minus nocet, accidere, nemo facile negabit. Vasa enim vero, quae ob atoniam ac laxitatem sanguinem effundeant, applicata glacie magis magisque debilitantur, & si hoc vocabulo uti licet, in localem lipothymiam praecipitantur. Collapsa tunc, quae prius cruorem emittent vasa, sanguinem pauca vi a corde & arteriis propullulantem, non amplius suscipiunt. Silet hinc haemorrhagia: dicesne morbum sanatum esse? Minime hercle! Porro si medicus, quo tempore morbus servat inducias, mali curationem cum stimulantibus aggreditur, ridiculum prorsus esset, felicem morbi exitum frigori adscribere, quum ille excitantibus deberetur. Si vero quo tempore, ope glaciei haemorrhagia sedata quiescit, alia debilitantia imperantur, tunc non sine ratione, ut indies evenit, de aegrotantis salute desperatur. Sed hanc de frigoris actione sen-

---

chlearia tria sumere, conabatur miserrima. Glaciei, ciborum gelidorum, & venae sectionis usu seposito, tincturam cinnamomi cum pauxillo laudani aliquoties in die sumendam iussi, sensim sensimque excitantium remediorum, & ciborum dosim adaugendo, trium dierum spatio foemina convalescens lectum derelinquere potuit (*Edit.*).

tentiam continuatae experientiae, utpote summae in rebus physicis magistrae, vel comprobendam amplius, vel reiiciendam lubens confidensque relinquo. Neque enim systema ullum ita sum amplexus unquam, ut ab eo me avelli nullo modo patiar.



CAPUT

## C A P U T VIII.

### *Diabetes.*

**R**arissimi huius morbi, mihi tamen decies visi, duo exempla in Clinico Instituto pertractanda habui. Quum saepe pro diabete a medicis alii morbi, qui id nequaquam sunt, declarentur, ipsius definitionem omnibus antepo-  
nam, ea ductus ratione, ut lector de re-  
ctitudine diagnosis a me institutae certior red-  
datur. „ Est autem *diabetes* vera corporis per  
„ urinam colliquatio, aut lotii profluvium,  
„ vel copia potum longe superante, utpluri-  
„ mum, vel principii saccharini admittance  
„ superans, cum siti inexplebili, cute arida,  
„ squamosa, & macie extrema sine febre in  
„ longum plerumque incedens (a) “. Unus  
ex meis aegrotis *diabete insipido*, ut vocant,  
*Pars II.* G

---

(a) Epit. de cur. morb. T. V. §. 478.

alter vero sic dicto *diabete mellito*, affectus erat. Ille sanatus nosodochium dereliquit, hic autem Institutum Clinicum paucis ante mortem diebus deseruit. Eorum historiis permulta hoc loco, circa huius morbi causas, symptomata, praemittere oporteret. Sed cur tot hypothesibus nova adderem? Pauca tamen, quid de his sentiam, succincte, seposita omni hypothesi, proferam.

Immortalem SYDENHAMUM naturam diabetis, & ipsius originem, accuratius quam reliqui medici, qui eundem vel praecessere, vel secuti sunt, fecerunt, agnovisse, minime dubito. A debilitate enim ille huius morbi causam proximam derivabat (a). Homines revera, qui diabete praesertim obnoxii vivunt, senes, a febre intermittente, venae sectionibus, & catharticis, viribus privati sunt, quod idem SYDENHAMUS testatur. Unus ex diabeticis, quos elapsis annis in Clinico Instituto observavi, magnas varium haemorrhagias a prima iuventute passus erat.

Morbi porro, qui cum diabete societatem inire solent, cuncti a debilitate quoque pendent. SAUVAGESIUS (b) diabetis exemplum, qui cum hydrope incedebat, refert.

(a) Constitut. epidem. an. 1675-1680.

(b) Nosolog. method. T. III.

Pata plurima eorum, quos Pater meus in hoc morbo tractavit, hydropem contraxerat. Diabetici simul scorbuto affecti. BANGS (a) mentionem fecit. Idem SAUVAGESIUS huius morbi exemplum adducit, cui osium emollitio praecessit (b).

Causae denique, a quibus diabetes generatur, singulae debilitando agunt. Maxima tamen illarum pars hunc effectum nimis stimulando ac vitale principium exhaustiendo, producere videtur. Helluones, illosque qui venere abutuntur imprimis ab aegritudine hac prehendi, facta medica, nec non propriae observationes docent. Venenum serpentis *diapsadis*, alias *prester* dicti, a quo diabetem natum fuisse medici antiquitatis fatentur, nimis quoque stimulando agisse, mihi quidem probabile videtur. Celeb. TRNKA (c) ab ira, terrore hunc morbum originem duxisse, testatur. CULLENIIUS (d) & PLACE (e) a defectu assimilationis diabetem oriri existimant. Haec ventriculi debilitas tamen nonnisi morbi

G 2

(a) Acta Societ. med. R. Havniens. Vol. I. p. 2.

(b) L. c. T. II.

(c) Commentar. de diabete.

(d) Primae Lin.

(e) De vera diabet. causa in defectu assimilationis quaerenda. Goetting. 1784.



effectus effect. Contra opinionem istam Doct. CAWLBY, ea ductus ratione, desurgit: quod signa pravae digestionis non praecedant, quod iuniores & robustos (de hac re valde opere dubito) saepe morbas invadat; quodque saepe cibos vehementer appetant. Et ego plurimum famem summam ab aegrotantibus diabeticis accusatam esse audiui; sed, quaeso, an semper fames ista praeternaturalis a nimio corporis vigore derivanda est? In morbis, qui a debilitate pendent, licet saepe ciborum desiderium deletum sit, fames nihilominus non raro observatur. Ipsa acida in primis viis, quae debilitatis esse productum nemo negabit, quoties famem insignem non excitant? Sub phthiseos ultima etiam periodo, in qua certe summa iam adest virium prostratio, fames tamen haud raro urget, pluresque morti ex aliis quoque morbis iam vicinos, in querelas de fame prorumpere audiui. Aliquoties dein & anorexiam in diabete observavi, quod e sequentibus morborum historiis elucebit. Minime interim ignoro, allatas causas ad huius morbi originem explicandam semper sufficere. Posset enim aliquis obicere: morbos, qui a debilitate oriuntur, inter omnes frequentissimos esse, diabetem vero rarissime observari. Sed, quisne precor, ignorat, certam causarum vim ac complicationem aegritudines posse

aspectu inter se diversissimas generare, quin ideo intrinsece a se invicem differant? Quid denique miri, si illa complicatio causarum debilitantium, quae diabetei ansam porrigit, rarior, quam illa, quae febres intermittentes generat, esset? Adde, quod diabetes forsitan longe minus infrequens, quam vulgo existimatur, sit, quum saepe docente CAWLEYO, urinae copia naturalis observetur, nihilque praeter dulcedinem, morbofi ostendat. Hoc in casu aegritudo facillime sane a medicis non dignoscitur. Recepta pro causa diabetes debilitate corporis totius, lotii secretionis auctae origo, atque illa principii saccharini, explicatu haud difficilis esset. Affinitates enim chemicae, quae, quum vis vitalis viget, in machina animali huic ipsi subiectae sunt, in morbis a debilitate pendentibus, ubi scilicet vis vitalis languet, magnam scenam ludunt, atque varios mirosque effectus produnt. Ex principiorum igitur *carbonii*, *oxygenii*, *hydrogenii* complicatione varia ac mixtione, itiusmoda phaenomena per facile explicari possent ab illis, qui simplicitate non contenti, debilitatem solam pro diabetes causa haud lubenter admitterent. In hoc morbo urinae origo certe non in solis fluidis quaerenda. Ipsa solida in lotium convertuntur. Egregia certe & attentione admodum, sub hoc adspe-

etū, digna diabetis definitio est, quam ARETAEUS sequenti sermone nobis dedit. „Diabetes est carniū ac membranarū in urī, nam colliquatio“. Cibi cuncti, licet solidi, in lotium mutantur. Hinc nil miri, si urinae pondus illud potulentorum superare mihi dicas; nihilque miri, si principium saccharinum, quod in dies tanta quantitate assumimus, in urina detegatur. In singulis fere humoribus animalibus saccharum hinc inde invenitur. Doct. HUNERWOLF (a), in phthisi, cerumen aurium ab aegro & adstante foemina gustatum, *pro dulci* quod iam HIPPOCRATI notum fuit, declarari audivit. Sputa phthificorum ad nauseam usque dulcia non raro observantur. An dulces forsitan interdum & sudores colliquativi?

Quantitas sacchari, quae saepius in urina diabeticorum detegitur, longe magis conspicua, quam in reliquis humoribus est. Ipse ego, sex circiter abhinc annis, urinam diabeticī, qui in Clinico Instituto degebat, chemice examinaui. Sub leni evaporatione, ex viginti quatuor libris urinae, uncias viginti sex substantiae saccharinae obtinui. Egregius

---

(a) Ephem. natur. curiosor. dec. II. ann. 3. Observ. 91.

chimicus, celeb. MARABELLI, ope congelationis ab urina diabetici, cuius historiam sub Nro II. exponam, summa cum facilitate saccharinum principium nuper separavit. Est enim analysis hac ratione suscepta omni alii longe anteponenda, quum sic constituentia ab igne minime immutentur. Praeter saccharum, quod a diabeticorum urina separavi, addito huic acido nitrico, acidum *oxalycum*, quod iam dudum alii fecerunt, obtinui. Experimenta sic DOBSONII, DARWINII, quum repeterem, alia quaedam nova in mentem mihi venerunt. Fermentationem scilicet sic dictam vinosam, cui urina diabeticorum, quae saccharum continet, subiecta est, sedulo observans, an ex illa *Alcohol* praeparari posset, experiendum statui. Ad hunc scopum quadraginta lotii sub diabete emissi, libras, quibus pauxillum fermenti panis adieci, sumpsi. Haec omnia per biduum in loco moderate calido servans, denique more solito, sub leni igne distillationi submisi. Mox *Alcohol* in conspectum venit, quod admota flamma, bene ardebat, cuiusque aliqua portio in museo pathologico Ticinensi, servatur. Similem lotii copiam per sex circiter dies in eodem loco reliqui, donec scilicet fermentatio acida comparuerit: quae tunc aequa ratione distillationi subiecta, sat largam *aceti* copiam dedit. Ex-

perimenta haec singula invenias descripta ab ill. FOURCROY (a).

Circa diabetis naturam pauca hisce omnibus addere, mihi liceat. Sitis, quae in hoc morbo inter praecipua symptomata spectat, originem diabetis, atonicam ultro confirmat. Illa enim ab aquae potatione non solum non imminuitur, sed immo valdopere augetur. Vinum meracum sitim contra sedare, aegroti omnes uno ore fatentur. *Potus excitans*, de quo alibi locutus sum, eundem effectum prodit. Remedia porro omnia, quae in diabetis curatione proficua detecta fuere, nonne singula ad roborantia, sive excitantia spectant? Talia certe sunt, *Alumen*, *Cantharides*, *Pulvis DOWERI*, ipsum *Opium*, *Cuprum ammoniacale*, *Cortex Peruvianus*, *Mercurius* &c.

Quum vero curatio huius morbi tam difficilis sit, & saepe impossibilis evadat, nonne forsitan suspicio haberi posset, de vitio locali, ab universali prius debilitate generatum? Non anderem aliquid super hanc rem asserere. Sufficiat interim mihi, hisce omnibus praemissis, duos illos, quos asserre pollicitus sum, casus, exacte hic nunc describere.

---

(a) Journal.

## HISTORIA I.

Quinquagenarius, *Aloysius de Antoni*, ex Feudis Imperialibus, ille est, qui morbum attentione nostra dignissimum, ob raritatem, tractandum exhibuit. Vir iste scilicet, optimo instructus corporis habitu, propitiam semper habuit salutem, si paucas excipiam febres intermittentes, atque capitis dolorem, qui originem suam agnovit, tribus abhinc annis, cum ex adverso fato in flumen quoddam cecidisset. Die vero septima octobris huiusce anni, cum oryzae secundae cassae in aqua pedibus degeret, ad vespertas siti sat vehementer corripitur, ac mox urinae copia aucta, oris siccitas, lenisque diaphoresis per hebdomadam solummodo durans, appetitus aliqua depravatio, atque muneris sui fungendi impotentia, sese adsociarunt; quo sub rerum statu per mensem integrum mansit, quin opem aliquam a medica perquireret arte; praeterlapso vero illo tempore, medicum accersiri curavit; qui pulveres, nescio quos, sero lactis solutos propinavit; a quibus alvus bis vel ter de die movebatur, cum debilitatis augmento. Dein medietatem versus elapsi mensis novembris nosocomium Mediolanense petiit, in quo pharmaca aliqua mihi ignota propinata fuere,

sed octo elapsis diebus ob morbi longaevitatem e nosodochio expulsus fuit, domique mansit usque ad elapsam diem decembris nonam. Hac die aegrotus in Clinicum Institutum recepto, meisque tradito observationibus, sequentia adnotatu digna in conspectum sese prodidere. Siccitatis sensus ad os, ac sitis vix poculo a labris remoto recrudescens, virium summa prostratio, de die in diem aucta, cutis arida, macies conspicua, licet etiam sub statu sano pinguis non fuerit aeger, urinae copia aucta, sed nec dulcis, nec salsedinea, limpida, ut aqua fontis. Ardor stomachi, surarum dolor, quae etiam ab initio morbi non defuerant, praesto erant. Appetitus optimus, pulsus a naturali statu non abluens. Febris hucusque non apparuit, lingua satis humida, dolor capitis ingens, alvus potius tarda; ob debilitatem, motus aliquantisper impeditus, sitis urinaeque copia magis versus noctem adaucta apparent. Interrogato aegro, quinam potus sitim sibi magis falleret? vinum esse respondit. Quibus omnibus rite perpensis, diabetem insipidum coram haberi, nemo est, qui non videat. Causas adparentes nullas adducit, praeter veneris abusum, nimios labores praegressos, victus tenuitatem, spirituosorum defectum. Cum vero agatur de morbo, qui tam pauca felicitis exitus nobis offert

exempla , atque contrarii nobis quam plurima non deficient , non nisi valde dubiam , periculique plenam prognosin pronuntiare possum . Paucam interim , quae remanebat , spem in remediorum excitantium usum , reposuimus ; quum vero necdum morbus satis elucesceret , decoctum hordei pro potu , & dietam tertiam praescripsimus .

*Mane 10. Octobris, & 63ma morbi die.*

Hac nocte , ob sitim urgentem , atque continuam a potu sumpto mingendi necessitatem , parum dormivit . Alvus non aperta , urinarum nec dulcedinem , nec salsedinem ostendentium libras viginti tres miuxit . Decocti communis libras viginti septem , potavit .

*R. Cupri ammoniacalis granum unum ,  
Sacchari albi scrupulum unum .*

*M.*

*Fiant doses tales duae , capiat unam  
mane alteram vespere .*

*Diaeta quarta .*

*Vespere.*

*Caetera continuant . Sumat alterum pulverem .*



*Mane  $\frac{11}{24}$ .*

Parum dormivit ob fitim moleſtam. Totius corporis pondus ad libras 132 aſcendebat. Urinae libras 38  $\frac{1}{2}$  minxit. Calculo facto ab heri mane uſque nunc, & confideratis omnibus, tum fluidis, tum ſolidis, quae ſumpſit, ſingularum pondus librarum 39 fuit. Alvus ſemel mota; excrementa uncias quatuor ponderabant.

*R. Cupri ammoniacalis granum unum,  
Sacchari albi ſcrupulum unum.*

*M.*

*Fiant doſes tales duae, capiat unam mane, alteram vespere.*

*Diaeta quarta.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Sumat alterum pulverem.*

*Mane  $\frac{11}{65}$ .*

*Libras 41 urinae minxit, & 48 de-*

cocti alimentorumque sumpsit : Febris nulla,  
cetera continuant .

*R.* Cupri ammoniacalis granum unum  
cum dimidio ,

Sacchari albi scrupulum unum .

*M.*

Fiant doses tales duae ; capiat unam  
mane , alteram vespere .

*R.* Aquae font. libras duas ,

Spiritus vini uncias duas ,

Mellis despumati unciam unam cum  
dimidia .

*M.*

Detur pro potu .

*Diaeta quarta .*

*Vespere .*

Nil novi . Sumat alterum pulverem ; in  
potu spirituofo , & diaeta continuat .

*Mane*  $\frac{11}{12}$  .

Urinae libras 43  $\frac{1}{2}$  minxit , & 48 potus

cibique sumpfit; alyus semel mota, facces  
ascendebant ad drachmas sex. Obstitum, &  
nictum continuum parum dormivit; ad dor-  
sum dolorem accusat. Caetera eadem ratione  
continuunt.

*Repetantur pulveres, potusque ac diæta.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Sumat alterum pulverem. Habeat diæ-  
tam quartam, cum libra una vini. Potus  
spirituosus repetatur.*

*Mane.*

Nec oculum clausit. Alyus non mota,  
caetera continuant. Urinae libras  $4\frac{3}{4}$  minxit,  
& 46 alimentorum tum fluidorum, tum soli-  
dorum sumpfit. Analisi instituta, urinae, a  
Pharmacopola Domino MARABELLIO exa-  
minatae, saccharinum principium non osten-  
derunt.

*R. Pulveris Doweri grana sex,  
Sacchari albi scrupulum unum.  
M.*

*Fiant doses tales quatuor, capiat unam  
omni trihorio.*

*Diaeta quarta cum libra vini.*

*Vespere.*

*Alvus semel mota. Caetera continuans  
symptomata.*

*Sumat reliquos pulveres, & in caeteris  
continuet.*

*Mane  $\frac{ii}{ii}$ .*

*Ad noctem non dormivit. Sitis continuo  
urget, alvus semel mota. Omnia, quae sum-  
psit, ascendunt ad libras 35, atque lotii pro-  
sus aquosi libras 31 minxit.*

*R. Pulveris Doweri grana decem,  
Sacchari albi scrupulum unum.*

*M.*

*Fiant doses tales sex: capiat ter de die  
unam.*

*In potu & diaeta continuet.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Continuetur in praescriptis.*

*Mane  $\frac{12}{9}$ .*

Aliquantisper quievit hac nocte, symptomata tamen omnia continuant, alvus semel mota. Libras quadraginta tum potus, tum cibi assumpsit, ac libras 40 urinae minxit.

*Rx. Pulveris Doweri grana quindecim,  
Sacchari albi scrupulum unum.*

*M.*

*Fiant doses tales sex; capiat ter de die unam.*

*In potu & diaeta continuetur.*

*Vespere.*

*Res eodem modo procedit. Continuetur in omnibus.*

*Mane  $\frac{17}{10}$ .*

*Hac nocte non dormivit. Libras 35  
quoad*

quoad victum & potum sumpsit, & libras 3 1/2  
urinae minxit. Dolor capitis, ardorque ven-  
triculi continuant, manuum ariditas crescit,  
alvus non mota; sopor, & vomitus non ap-  
parere; urinae eiusdem qualitatis & coloris  
sunt.

*R. Pulveris Doveri grana viginti.*

*Sacchari albi scrupulum unum.*

*M.*

*• In, 1812*

*Fiant doses tales sex, capiat ter de  
die unam.*

*In potu & diæta continuet.*

*Vespere.*

Per horam circiter dormivit, sudor nul-  
lus; nec vomitus, sitis vero continuo urget.  
Applicentur vesicantia, unum ossi sacro, al-  
terum ad regionem vesicae urinariae.

*Continuetur in pulveribus, potu, &  
diæta.*

*Mane  $\frac{ii}{a}$ .*

Hac nocte aliquantisper imminutus fuit  
dolor capitis; per horam circiter dormivit,

*Pars II.*

*H*

appetitus nullus, sitis eadem, urinae libras 32 minxit, & 32 alimentorum sumpfit. Alvus semel mota.

*Rj. Pulveris Doveri grana viginti quinque.  
Sacchari albi scrupulum unum.*

*M.*

*Fiant tales doses sex, capiat ter de die unam.*

*In potu & diaeta continuat.*

*Vespere.*

Per duas circiter horas dormivit, caetera continuant.

*Sumat reliquos pulveres; in potu & diaeta continuat.*

*Mane  $\frac{11}{12}$ .*

Bene dormivit, usque ad dimidiam noctem, qua elapsa, somnus fugit. Vomitus nullus, nec sudor. Urinae libras 32 minxit, & 34 ciborum ac potus sumpfit. Cutis aridior evadit, lingua humidiuscula; oris sensus siccitatis continuat, appetitus fere nullus.

*R. Vini optimi uncias duas ,  
Tinduræ cantharidum guttas duas.  
M.*

*Fiant doses tales duae , capiat unam  
mane , alteram vespere .*

*In potu & diæta continuet .*

*Vespere .*

*Nil novi .*

*Sumat alteram dosin ; continuet in cae-  
teris .*

*Mane  $\frac{20}{9}$  .*

Nox insomnis fuit ob continuos dolores  
dorsi, lumborum, surarum; in emittenda urina  
ardor se manifestat. Urinae libras 32 min-  
xit, & alimentorum 36 sumpfit, alvus semel  
mota, appetitus valdopere prostratus, sitis  
continuat.

*R. Emuls. amygdal. libras tres ,  
in qua solve ,  
Mucilag. arabicae ,  
Sacchari albi ana drachmas duas.  
M.*

*Capiat pro potu . In caeteris continuet .*

H 2



*Vespere.*

Dolores omnes increvere, praecipue in urina eliminanda; aliqua febris quoque se manifestavit.

*In emulsione continuet.*

*Mane  $\frac{21}{24}$ .*

Non dormivit, dolores omnes continuant; ardor in urina mingenda minor, appetitus nullus. Urinae libras 30 minxit, & 32 alimenterum sumpfit. Aliqua febris.

*R. Decoñ. cort. peruviani uncias novem*

*Laudani liquidi guttas viginti*

*Vini malvat. uncias sex.*

*M.*

*Omni bihorio cochlearia duo sumat.*

*R. Unguenti mercurialis drachmam unam.*

*Fiat friñtio.*

*In potu & diætâ continuet.*

*Vespere.*

Ardor in urina mingenda nullus, alii dolores continuant; ob morbi metum plorabat. Pulsus aliquantisper frequentes, debilitas augetur; cutis ariditas aucta, appetitus nullus.

*Continuavimus in medicina, potu, diaeta quarta cum duobus ovis.*

*Mane  $\frac{22}{11}$ .*

Libras 30 urinae minxit, & 31 nutrimenti tum fluidi tum solidi sumpsit. Alvus semel mota, appetitus nullus; aliquantisper dormivit, caetera continuant.

*In medicina, potu, & diaeta perseveret.*

*Rx. Unguenti mercur. drachmam unam.*

*Pro frictione.*

*Vespere.*

Dolor capitis & dorsi imminutus.

*Continuet in medicina interna, potu atque diaeta.*

*R. Vini malacensis uncias odo.*

*Mane  $\frac{21}{74}$ .*

Hac nocte non dormivit, debilitas & cutis ariditas augentur, salivatio nulla, sitis aucta, urinae quantitas maior, appetitus nullus, alvus semel mota.

*R. Unguenti mercurialis drachmam unam.*

*In potu, vino malacensi, medicina, & diaeta continuet.*

*Vespere.*

Nil novi.

*Repetatur potus, & diaeta.*

*Mane  $\frac{24}{77}$ .*

Non dormivit; salivatio incipit, sitis magna. Urinae libras 43 minxit, quae quantitas potum & victum non superat.

*Nil praeter potum & dietam.*

*Vespere.*

De summa conqueritur debilitate, atque

de appetitu depravato; salivatio nulla; caetera continuant.

*Continuetur in potu & diaeta.*

*Mane  $\frac{24}{72}$ .*

Non dormivit; universalem tremoris sensum accusat; urinas eadem quantitate, ut heri, minxit, salivatio nulla, caetera continent.

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*Fiat frictio mercurialis ad drachmam unam.*

*Repetatur potus & diaeta.*

*Vespere.*

Summam accusat debilitatem, caetera continent.

*R. Haustus narcotici uncias tres.*

*In caeteris continuet.*

*Mane  $\frac{14}{72}$ .*

Non dormivit, ob continuam mingendi

H 4

necessitatem. Urinae libras 31 minxit, non  
vero superant potum & cibos. Salivatio nulla.

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*Repetatur frictio ad drachmam unam cum  
dimidia. In caeteris continuet.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*R. Haustus narcotici uncias quatuor.*

*Cipiat quatuor vicibus.*

*Diaeta quarta, cum libra vini, & iu-  
sculis carneis.*

*Mane  $\frac{17}{16}$ .*

Vix aliquid somni apparuit; debilitas,  
& bibendi desiderium continuant. Urinae li-  
bras 28 minxit, victum & potum non supe-  
rantes.

*R. Vini malacensis libram unam.*

*Repetatur frictio mercurialis ad drach-  
mam unam cum dimidia. Diaeta quarta.*

*Vespere .*

*Nil novi .*

*R. Haustus narcotici uncias quinque.*

*Capiat quinque vicibus .*

*Diaeta tertia .*

*Mane  $\frac{19}{11}$  .*

Aliquantisper dormivit . Bibendi necessitas imminuta est , hinc minorem partem potus consueti assumpsit ; urinae eadem proportionem decrescunt , aliqua gingivarum irritatio persentitur . Vinum appetit . Pulsus melior .

*Repetatur frictio mercurialis ad drackmam unam cum dimidia .*

*R. Haustus narcotici uncias tres ,  
Aquae cinnamomi uncias quatuor .  
M.*

*Capiat paulatim in die .*

*R. Vini malvatici uncias novem .*

*Vespere.*

Res eodem modo continuant. *Continnetur medicina.*

*℞. Vini malacensis libram unam.*

*℞. Haustus narcotici uncias quinque.*

*Divide in octo partes aequales, capiat unam omni hora.*

*Mane  $\frac{10}{11}$ .*

Aliquantisper dormivit, se melius habere asserit aegrotans. Aliqua adest salivatio, pulsus elevationes, aspectus melior. Sitis non eadem vi, ac alias, urget. Aliqua ad gingivas irritatio. Urinae iam a duobus diebus ad libras 27 descendant in die, atque superantur a potus & cibi quantitate. Iam a quatuor diebus faeces non deponit.

*℞. Vini malacensis uncias novem.*

*Repetatur frictio ad drachmam unam cum dimidia.*

*R. Pulveris corticis peruviani drachmas  
duas,*

*Opil puri grana duo.*

*M. exacte, & divide in quatuor partes  
aequales, capiat unam omni bihorio.*

*Vespere.*

*Res eodem procedunt modo.*

*Continuet in medicina, & diaeta.*

*R. Vini malacensis libram unam.*

*Mane  $\frac{10}{4}$ .*

Mediocriter dormivit, sed sub somno  
formicationis sensum persentire asserit hinc  
inde aegrotans; aliqua adeit salivatio, sub  
qua metalli saporem nauseosum persentit aeg-  
ger. Aliquis capitis dolor, & non mediocris  
debilitas continuant; urinae quantitas, ut heri.

*Repetatur medicina.*

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*Fritio ad drachmam unam; diaeta ea-  
dem.*



*Vespere.*

*Nil novi.*

*Continuet in medicina.*

*R. Vini malacensis uncias oñō.*

*Diaeta eadem.*

*Mane  $\frac{II}{II}$ .*

Parum dormivit, sitis magna; urinae iterum ad libras 30 ascendunt, non superant tamen cibi & potus quantitatem. Aliquis, sed parvus irritationis sensus per sentitur ad gingivas. Dolores apparent ad vesicae regionem, & ad urethram; praecipue sub mictu. Pulsus debiliores, dolor capitis, atque caetera symptomata continuant.

*Repetatur medicina.*

*R. Vini malacensis uncias oñō.*

*Diaeta quarta. Frictio ad drachmam unam cum dimidia.*

*Vespere.*

Summa debilitas, & sitis denuo apparent, dolor vesicae & urethrae continuat, alvus ter mota cum magno ténesimo.

*Dieta quarta.*

*R. Haustus narcotici uncias tres.*

*Capiat tribus vicibus.*

*Fomentum emolliens loco dolenti.*

*Mane  $\frac{1}{11}$  Ianuar. 1795.*

Parum dormivit, appetitus nullus, ardor in emittenda urina minor, aliquis pruritus ad gingivas, urinae aquosae ad libras 22 mixxit, sitis imminuta est.

*Repetatur frictio ad drachmam unam cum dimidia.*

*R. Pulveris corticis peruviani drachmas duas,*

*Opii puri grana duo,*

*Infunde in vini malacensis unciis octo.*

*M.*

*Capiat omni quadrihorio quartam partem.*

*R. Vini malacensis uncias oño.*

*Diaeta eadem.*

*Vespere.*

Res melius procedit; dolores & ardor  
in urina mingenda imminuti.

*R. Vini malacensis uncias oño.*

*Mane  $\frac{1}{2}$ .*

Hac nocte bene dormivit, ardor in urina  
mingenda nullus, sitis imminuta, appetitus  
idem, urinae libras 20 minxit.

*Repetatur medicina.*

*R. Vini malacensis uncias oño.*

*Repetatur frictio ad drachmam unam  
cum dimidia.*

*Diaeta eadem.*

*Mane  $\frac{1}{2}$ .*

Bene dormivit; melius se habere dicit;

aliquis ardor ad gingivas successit, sed salivatio nulla, sitis pauca; urinae libras 12 magis coloratae minxit, & omnia symptomata imminuta; alvus semel mota, sine tenesmo.

*Repetatur medicina, vinum, diaeta, & frictio mercurialis ad drachmam unam cum dimidia.*

*Vespere.*

Nil novi.

*Continuetur.*

*Mane  $\frac{1}{2}$ .*

Res bene procedunt. Optime quievit, urinae magis coloratae parumque dulcis libras 18 minxit, alvus semel mota, appetitus desideratur, sitis imminuta, aliquis ardor ad gingivas, sed salivatio nulla, dolores imminuti.

*Repetatur medicina, vinum malacense, diaeta, & frictio mercurialis ad drachmam unam cum dimidia.*

*Vespere.*

Nil novi.

*Continuet in vino & medicina.*

*Mane  $\frac{1}{2}$ .*

Hac nocte bene quievit, debilitas non sanata, alvus semel mota, sed parum, & cum magno tenesmo; fitis pauca; urinae magis coloratae libras solummodo 15 minxit; appetitus idem, salivatio nulla, oris siccitas imminuta.

*Repetatur medicina, vinum malacense, diaeta & frictio mercurialis ad drachmam unam cum dimidia.*

*Vespere.*

Desidendi ad alvum magna voluntas, sed cum sellam petiisset, tam magno correptus est tenesmo, ut faeces, nimis forsitan duras, excernere non potuerit; dolores ad urethram nulli.

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*Diaeta eadem.*

*Mane*

*Mane 6.*

Hac nocte bene quievit, fitis pauca, dolores imminuti, urinae iterum aquosae, magisque dulcis libras 16 minxit.

*Repetantur omnia. Frictio mercurialis ad drachmam unam cum dimidia injiciatur.*

*Vespere.*

Nil novi.

*Continuetur.*

*Mane 2.*

Bene dormivit, alvus semel mota, sed cum magno tenesmo & dolore; faeces sunt durissimae, & parcae; dolor capitis auctus, fitis imminuta, appetitus nullus, urinae libras 12 solum minxit. Continuavimus in omnibus, omitta frictione.

*✱ Vini malacensis uncias octo.*

*Diaeta eadem.*

*Pars II.*

**I**

*Mane  $\frac{1}{2}$ .*

Bene dormivit, alvus semel mota, sed parum, & cum magno tenesmo; urinae naturali colore & sapore praeditae, libras 12 minxit.

*Repetantur omnia, praeter frictionem.*

*Vespere.*

Nil novi aderat.

*R. Vini malacensis uncias octo.*

*Mane  $\frac{2}{3}$ .*

Aliquantisper quievit, ardor gingivarum & siccitatis sensus ad os imminuti, sitis pauca, appetitus nullus, cutis minus arida, dolor capitis continuat, os valde amarum; alvus semel mota, sed non cum tanto tenesmo, urinae fere naturalis libras 10 minxit, se melius habere, & sanum esse dicit, si appetitus vigeret.

*R. Vini malacensis uncias octo,  
in quibus solve*

*Opii puri granum unum. Adde*

*Pulveris corticis peruviani drachmas  
duas.*

*M.*

*Capiat omni bihorio quartam partem.*

*R. Vini malacensis uncias oño pro potu.*

*Diaeta eadem.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Continuet medicinam. Dein*

*R. Vini malacensis uncias oño.*

*Diaeta eadem.*

*Mane  $\frac{10}{14}$ .*

Hac nocte parum quievit. Siccitatis sensus ad os auctus, & sitis; urinae magis tinctae libras 16 minxit. Os amarum, alvus semel mota, sine tenesmo.

*R. Vini malacensis uncias oño,*

*in quibus solve*

*Opii puri grana duo. Adde*

*Pulveris corticis peruviani drachmas duas.*

*M.*

*Capiat omni quadrihorio quartam partem.*



*Vespere.*

E lecto surrexit, melius se habere dicit.  
Pomum citrinum desiderat.

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*Pomum citrinum. Dieta eadem.*

*Mane  $\frac{11}{2}$ .*

Bene dormivit; oris amaror nullus, fitis imminuta; urinae naturales, ad libras 10 solummodo minxit; caetera continuant.

*Repetatur medicina.*

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*Dieta eadem.*

*Vespere.*

E lecto surrexit, fitis imminuta, urinae ad vespertas sunt magis aquosae, os non amarum.

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*In caeteris continuet.*

*Mane  $\frac{11}{24}$  .*

Parum dormivit, sitis non tanta, alvus semel mota, sine tenesmo, os amarum, appetitus nullus, debilitas magna, urinae magis tinctae matutino tempore ad libras 14 ascendunt.

*Repetatur medicina.*

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*Diaeta eadem.*

*R. Unguenti mercurialis drachmam unam cum dimidia.*

*Fiat frictio.*

*Vespere.*

E lecto surrexit; sed ob magnam debilitatem multos gressus facere non potuit. Caetera continuant.

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*Diaeta eadem.*

*Mane  $\frac{m}{n}$ .*

Aliquantisper quievit, salivatio nulla;  
urinae libras 12 minxit. Caetera continuant.

*R. Vini malacensis uncias octo,  
in quibus solve  
Opii puri grana duo. Adde  
Corticis peruviani drachmas duas.*

*M.*

*Capiat omni quadrihorio quartam partem.*

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*Repetatur frictio ad drachmam unam  
eum dimidia.*

*Vespere.*

E lecto surrexit, sed ob magnum frigus  
iterum plumas petere coactus fuit. Sitis con-  
tinuat, urinae magis tinctae, caetera conti-  
nuant.

*Continuet in medicina. Dein*

*R. Haustus narcotici uncias duas.*

*Diaceta eadem,*

*Mane*  $\frac{2}{3}$ .

Aliquantisper quievit, alvus semel aperta; urinae libras 12 minxit, magis tinctae sunt mane, quam vespere, sitis atque inappetentia continuant, aliquis ardor ad gingivas, sed salivatio nulla.

*R. Vini malacensis uncias septem,  
Pulveris corticis peruviani drachmas  
duas,  
Opii puri grana tria.  
M.*

*Capiat omni quadrihorio quartam partem.*

*Repetatur frictio ad drachmam unam  
cum dimidia.*

*R. Vini malacensis uncias octo.*

*Diaeta eadem.*

*Vespere.*

*Nil novi. Urinae adhuc tinctae.*

*R. Haustus narcotici uncias duas.*

*Capiat duabus vicibus.*

*Mane*  $\frac{11}{99}$ .

Aliquantisper quievit. Dolor capitis, fitis, inappetentia atque debilitas continuant. Aliquis gingivarum dolor.

*R. Aquae cinnamom.*

— — fontis ana uncias tres.

Laudani liquidi guttas quadraginta.

*M.*

*Capiat omni quadrante horae cochleare unum.*

*R. Pulveris corticis peruviani drachmas duas,*

*Vini malacensis uncias septem.*

*Capiat omni quadrihorio quartam partem.*

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*Diacta eadem.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Continuet.*

*Mane  $\frac{16}{100}$ .*

Ad noctem aliquantisper quievit, fitis & inappetentia continuant; urinae naturalis libras 10 minxit.

*Repetantur omnia heri mane praescripta, & frictio ad drachmam unam cum dimidia.*

*Vespere.*

Nil novi.

*R. Haustus narcotici uncias tres, capiat tribus vicibus.*

*Mane  $\frac{19}{100}$ .*

Urinae libras decem minxit, bene dormivit, sed fitis, debilitas, & inappetentia continuant.

*Repetatur medicina heri mane praescripta, & frictio ad drachmam unam cum dimidia.*

*Vespere.*

Nil novi.

*R. Haustus narcotici uncias tres.*

*Capiat tribus vicibus.*

*Mane  $\frac{11}{162}$ .*

*Urinae libras 9 minxit, sed caetera  
continuant symptomata.*

*R. Aquae cinnamomi,  
— — menth. ana uncias tres,  
Laudani liquidi guttas triginta.  
M.*

*Capiat omni quadrante horae cochlear. unum.*

*R. Pulveris corticis peruviani drachmas  
duas,  
Vini malacensis uncias septem.  
M.*

*Capiat omni quadrihorio quartam partem.*

*R. Vini malacensis uncias novem.*

*Repetatur frictio ad drachmam unam cum  
dimidia.*

*Diaeta eadem.*

*Vespere.*

Nil novi.

*R. Haustus narcotici uncias tres.*

*Capiat tribus vicibus.*

*Mane  $\frac{12}{104}$ .*

Urinae libras solummodo miuxit 7, naturali colore & sapore praeditas, sed sitis, inappetentia, & debilitas continuant.

*Repetantur omnia heri mane praescripta, & frictio ad drachmam unam cum dimidia.*

*Vespere.*

Nil novi.

*R. Haustus narcotici uncias tres.*

*Capiat tribus vicibus.*

*Mane  $\frac{12}{104}$ .*

Hac nocte bene quievit, alvus semel mota, caetera continuant.



*Repetatur medicina heri mane praescripta. Frictionem ad drachmam unam cum dimidia, & balneum ad gradus caloris XXVIII Thermometri Reaumuriani praescriptissimus.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*R. Haustus narcotici uncias tres.*

*Cipiat tribus vicibus.*

*Mane  $\frac{31}{101}$ .*

Hac nocte bene quievit; sitis, debilitas atque inappetentia continuant; urinae libras 7 minxit.

*Repetatur medicina, & frictio ad drachmam unam cum dimidia, & balneum ad gradus 32.*

*Vespere.*

Balneum intravit; minime sudavit, & calorem sat mitem fuisse, potiusque frigoris sensum persentisse dixit; caetera continuant.

*℞. Haustus narcotici uncias tres,*

*Capiat tribus vicibus,*

*Diæta eadem.*

*Mane  $\frac{23}{100}$ .*

Hac nocte bene quievit, caetera continuant; urinae libras 6 minxit; gingivarum ardor auctus.

*℞. Myrrhae electae drachmam unam cum dimidia,*

*Solve in vitello ovi,*

*adde*

*Decocti corticis peruviani,*

*Aquae cinnamomi ana uncias quatuor,*

*Opil puri grana tria,*

*Syrupi corticis peruv. unciam unam.*

*M.*

*Capiat omni hora cochlearia duo.*

*℞. Vini malacensis uncias novem.*

*Vespere.*

*Nil novi; fitis imminuta.*

*Repetatur medicina.*

*Mane*  $\frac{85}{107}$ .

Hac nocte bene quievit, urinaeque ad colorem & copiam naturales; vix sitis aliqua; appetitus aliquis.

*R. Decodi corticis peruviani uncias novem,*  
*Hausus narcotici uncias tres,*  
*Extraði corticis peruviani unciam dimidiam,*  
*Syrup. corticis eiusdem unciam unam.*  
*M.*

*Capiat omni bihorio cochlearia duo,*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Hausus narcotici uncias tres.*

*Capiat tribus vicibus.*

*Mane*  $\frac{24}{101}$ .

Bene quievit; urinae naturales; dolor capitis, & debilitas continuant, & licet ap-

petitum nunquam habere dicat, tamen sat bene comedit, libras tres vini bibit de die, totamque dietam tertiam assumit. Siccitatis sensus ad os nullus: fitis naturalis, cutis minus arida, aspectus melior, & plura mala potius finguntur, ob nosocomii amorem, & cibi aviditatem.

*R. Decoctionis corticis peruviani uncias novem,*

*Haustus narcotici uncias tres.*

*M.*

*Capiat omni hora cochlearia duo.*

*R. Vini malacensis uncias novem,*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*R. Haustus narcotici uncias duas.*

*Capiat duabus vicibus.*

*Mane  $\frac{ss}{dos}$ .*

Hac nocte optime quievit, alvus semel

moja, urinae naturales, in caeteris melius se habet.

*Repetantur medicina, & vini malacensis unciae odo.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Continuet in medicina.*

*R. Vini malacensis uncias sex.*

*Mane.  $\frac{25}{12}$ .*

Urinae naturales, in caeteris bene se habet.

*R. Decocti corticis peruviani uncias novem.*

*Capiat omni bihorio cochlearia duo.*

*R. Vini malacensis unciae sex.*

*Diacta eadem.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*R. Vi-*

*R. Vini malacensis uncias sex.*

*Mane  $\frac{xv}{iii}$ .*

Ad noctem bene quievit; appetitus urget, aspectus melior, urinae naturales quoad copiam & colorem, nec non saporem, debilitas non tanta, cutis minus arida.

*Repetatur decoctum corticis.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*R. Vini malacensis uncias sex.*

*Mane  $\frac{xv}{iii}$ .*

Quievit. Bene in caeteris se habet.

*Repetatur medicina & dieta.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*R. Vini malacensis uncias sex.*

*Pars II.*

*K*

*Mane*  $\frac{ss}{iii}$ .

*Nil novi.*

*R. Vini malacensis uncias sex.*

*Vespere.*

*Repetatur vinum malacense.*

*Mane*  $\frac{ss}{iii}$ .

*R. Decoctum corticis peruviani.*

*Diaeta eadem.*

*Vespere.*

*Nil praescriptum est.*

*Mane*  $\frac{ss}{iii}$ .

Bene quievit. Alvus bis mota, debilitas aliqua, ardor stomachi continuat.

*Repetantur singula.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Nulla medicamenta.*

*Mane*  $\frac{11}{11}$  *Februarii.*

*Res bene procedunt. Appetitus.*

*Repetantur singula.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*R. Vini optimi libram unam.*

*Mane*  $\frac{11}{11}$ .

*Bene dormivit. Ardor stomachi conti-*

*nuat, debilitas non tanta, appetitus viget,*  
*dolor capitis continuat, urinae naturales.*

*R. Decoctionis corticis peruv. libram unam.*

*Capiat omni bitorio cochlearia duo.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*R. Vini malacensis uncias sex.*

K 2



Mane  $\frac{1}{2}$ .

Debilitatem iterum accusat, & aliquam  
fitim, atque ciborum inappetentiam; urinae  
eaedem; ardor stomachi, & dolores suprarum  
continuant.

R. Decocti corticis peruviani uncias no-  
vem,

Aquae cinnamomi unciam unam cum  
dimidia.

Extracti gentianae scrupulos duos,

Syrup. corticis aurant. unciam unam  
cum dimidia.

M.

Capiat omnia bichoria cochlearia quatuor.

R. Vini malacensis uncias octo.

Vespere.

Nil novi.

Continuet.

Mane  $\frac{1}{2}$  & Vespere.

Nil novi.

Repetantur omnia.

*Mane  $\frac{1}{12}$ .*

Bene quievit. Debilitas continuat, urinae naturales, ardor stomachi idem, appetitus viget.

*R. Decoñ. cort. peruviani uncias novem,  
Aquae cinnamomi uncias tres.*

*M.*

*Capiat omni bñorio cochlearia duo.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Continuet.*

*Mane  $\frac{4}{12}$ .*

Bene quievit, resque optime procedunt.

*Repetatur medicina.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Continuet.*

**K 3**

*Mane*  $\frac{1}{m}$ .

Ardorem insignem ad scrobiculum cordis accusavit. In caeteris bene se habebat, aliquam tamen inappetentiam accusans.

*Rx. Pulveris corticis peruviani drachmam unam,*

*Rad. serpentar. virgin. drachmas duas,  
Nucis muscat. drachmam unam cum dimidia.*

*M.*

*Fiat cum syrupo corticum aurantiorum electuarium. Capiat omni bithorio drachmam unam.*

*Diaeta eadem. Vesicans ut rubefaciens ad scrobiculum cordis.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Continuet.*

*Mane*  $\frac{2}{m}$ .

Ardor disparuit, appetitus viget, de

medicinae amarore conqueritur, debilitas minor, aspectus parum a naturali statu aberrans, alvus bis mota.

*Repetatur medicina.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Continuet.*

*Mane  $\frac{2}{m}$ .*

*Res bene procedunt.*

*℞. Decocti corticis peruviani uncias novem.*

*Capiat omni bihorio cochlearia duo. Dieta IV.*

*Vespere.*

*Nil novi.*

*Continuet.*

**K 4**

*Mane  $\frac{11}{12}$  & Vespere.*

*Nil novi.*

*Continuet.*

*Mane  $\frac{11}{12}$ .*

Nosocomio tandem valedixit. Urinæ erant naturales, quoad colorem & copiam; ardor stomachi nullus, cutis non tam arida, & corpus magis pingue, quam cum nosocomium petierat.

## HISTORIA II. (a).

Rusticus triginta & octo annos natus, vir robustus, suæque sorte beatus, optima hucusque gavisus est valetudine, si febrem intermittentem excipias, quam proxime elapso Septembri est passus, & a qua octo circiter dierum spatio absque pharmacis penitus convaleuit. At ante duos menses, quin in coitu peccasset, vel alium in rebus sic dictis non naturalibus errorem commisisset, inopinate molesta afficiebatur siti, quæ a potu, licet co-

---

(a) A D. Doct. BOTTURI descripta.

piose assumpto, non exstinguebatur; immo magis magisque recrudescens, non sine aegroti admiratione, de die in diem, potulentorum desiderium adaugebat, sub quorum postea usu urinae limpidae, ac naturalibus uberiores fluxere. Tali in statu aegrotus per aliquot dies agrorum culturae adhuc operam dabat; sed sensim sensimque tristis, ac morosus factus de virium prostratione quotidie magis magisque conquerebatur, ita, ut perseverante morbo post 40 circiter dies, frustra adhibito cichorei decocto, quod medicus praescripserat, propriis muneribus fungendis impar factus, lectulo se commiserit. Medicus demum accersitur, cuius consilio venae sectio instituitur, qua vix peracta non parum exasperantur morbi symptomata, & sic pristinae debilitati, altera accedit, ex sanguinis iactura. Rebus ita se habentibus, post quindecim dies domui valedixit, & die decima Ianuarii nostrum auxilium petiit, sequentia exhibens symptomata: scilicet, corporis habitum valde emaciatum, sitim sumram, nulloque potu fallendam, cutem valdopere siccam, linguam humidam, urinas, quas nosmetipsi gustavimus, dulces, & mellis saporem omnino referentes; frigoris sensum, qui a lumbis usque ad pedes extendebatur. Hisce perpensis, morbum pro diabete mellito declaravimus, & sic praescripsimus.

*R. Unguenti mercurialis drachmam unam.*

*Fiat frictio.*

*Decoctum commune pro potu. Diaeta  
IV. cum vini libra.*

*Die  $\frac{II}{4}$  Ian.*

Elapsa nocte bene dormivit; appetitus fere naturalis, uti heri, cum ad nos accessit aeger: pulsus debiles & frequentes sunt, ita, ut in minuto primo 96 ictus exhibeant, quae res etiam hesternae die a nobis observata fuit. Viginti quatuor horarum spatio decocti communis libras novem, & uncias octo, vini vero libras tres & dimidiam assumpsit. Alimentorum pondus ad libras octo ascendebat; urinas dulces ad libras octo, & uncias duas minxit. Potum tepidum desiderat; concedatur, & repetantur ea, quae heri praescripta fuere. Instituat urinae analysi. Alvum bis deposuit.

*Die  $\frac{III}{4}$ .*

Sitis minor fuit, frigus ad lumbos non amplius persentit. Urinae sub eadem alimen-

rorum & potulentorum copia uberiores factae sunt ita, ut ad decem libras cum dimidia ascendant.

*Continuetur in praescriptis.*

*Die 65 —.*

Heri vespere post visitationem frigus ad lumbos denuo persentit. Sitis minus molesta fuit. Potulentorum libras novem solummodo assumpsit, quorum dimidia pars vinum erat, altera decoctum hordei. Urinae pondus ad quatordecim libras ascendit cum dimidia.

*Continuetur in medicaminibus, quae heri praescriptissimus; dein exhibeantur vini optimae librae duae.*

*Die 66.*

Frigoris sensus disparuit. Sitis mitior facta est. Vini libras quinque cum dimidia, decocti libras tres & uncias sex potavit. Urinae libras 14 minxit.

*Continuetur in vino & decocto, ut supra, dein augeatur unguenti mercurialis do-*



*Sis, ad drachmam unam cum dimidia. Alvum semel deposuit.*

*Die 67 —.*

Sitis minor fuit quam heri. Vini libras quinque cum dimidia, decocti libras duas assumpsit. Urinae libras 13 & uncias tres excrevit.

*Continuetur in praescriptis, dein ingreditur balneum tepidum.*

*Die 68 —.*

Alvum bis deposuit. Pulsus non valde frequens, & minus debilis quam alias. Sitis imminuta est; vini libras tres cum dimidia, decocti libram unam potavit. Urinas minxit uti heri. Frigus ad pedes mitius factum est —.

*Repetantur singula, quae hesternae die exhibuimus, excepto balneo, a quo aliquis, ut aeger ait, dolor capitis insurrexit.*

*Die 69 —.*

Pulsus fere naturales. Sitis aliquantisper

adaucta est. Vini libras quinque cum dimidia, decocti libras duas assumpsit. Frigus ad pedes non amplius persensit aeger. Urinae libras decem cum dimidia minxit.

*Continuetur ut supra —.*

Facta analysi urinae, quam minxit die 62 & 63, clarissimus MARABELLIUS invenit, quod in singula urinarum libra, uncia una principii saccharini continebatur.

*Die 70 —.*

Sitis mitior quam heri; potulentorum copia erat quatuor librarum cum dimidia, quorum maior pars ex vino constabat. Urinarum pondus est septem librarum.

*Die 71 —.*

Heri post prandium diarrhoea accessit, sub qua alvum octies deposuit. Hac de causa dedimus hantus narcotici uncias tres. Vini libras tres cum dimidia, decocti libras tres potavit. Urinae libras sex excrevit, ad vespas dedimus sequentia.

*R. Decocti corticis peruviani. uncias sex  
 Aquae cinnamomi.  
 Haustus narcotici ana. uncias duas.*

*Capiat omni bihorio cochlearia dug. Vini libras duas.*

*Continuetur in decocto hordei.*

*Die 72*

Ad vespertas diarrhoea omnimode suppressa erat, sed aegrotus sopore laborabat, ideoque dedimus aquae menthae uncias quatuor, cum aetheris vitriolici drachma una. Capiat paulatim. Mane alvum non deposuit. Oris cavitas valde sicca, interim fitis non urget, nec aegro valde molesta est. Examinatis urinis, quas nudius tertius excrevit, invenimus, quod libra una ipsarum sacchari scrupulos decem continebat.

*R. Unguenti mercurialis drachmam unam.*

*Fiat frictio.*

*Vini libras duas.*

*Die 73 .*

Elapsa nocte alvum novies deposuit .  
 Vini libras quatuor cum dimidia , decocti li-  
 bram unam , & uncias tres assumpsit . Cutis  
 ariditas eadem est uti ab initio morbi . Uri-  
 nae quantitas ad libras quatuor ascendit .

*R. Emulsion. arab. uncias septem ,  
 Haustus narcotici uncias duas .*

*Capiat omni bihorio quartam partem .*

*Vini optimi libras duas .*

*Die 74 — .*

Alvum septies deposuit . Eandem uti  
 heri potus copiam assumpsit , ac urinae quanti-  
 tatem excrevit . Pulsus debiles , sed non val-  
 de frequentes .

*R. Decocti corticis peruviani uncias sex ,  
 Aquae cinnamomi uncias duas ,  
 Syrupi corticis aurant. unciam unam .  
 M.*

*Capiat omni bihorio quartam partem .*

*Vini optimi libras duas .*

## Die 75 .

Alvum semel deposuit. Oris siccitas aucta est. Vini libras quatuor & uncias sex, decocti libras duas assumpsit. Urinae libras octo & semis minxit.

*Repetatur decoctum corticis cum aqua cinnamomi ut supra.*

## Die 76 — .

Alvum bis deposuit. Potus, excepta medicina, ad libras decem ascendebat, cuius dimidia pars vinum erat. Ariditas oris continuat. Pulsus minus debilis quam praeterlapsis diebus. Urina ad libras decem ascendebat.

*Repetatur decoctum chinae cum aqua cinnamomi, dein :*

*℞. Unguenti mercurial. drachmam unam.*

*Fiat frictio.*

## Die 77 .

Sitis aucta est, lingua valdopere sicca.  
Pota-

Potavit ut heri. Urinae libras duodecim minxit. Conqueritur de frigore ad pedes, & de summa virium prostratione. Pulsus debiles & tardi facti sunt.

*Repetantur ea, quae heri exhibuimus, dein*

*R. Vini malacensis uncias sex.*

*Die 78. —*

Debilitas maior fit. Frigus inferiores artus adhuc occupat. Potavit ut heri, si vinum malacense excipias. Urinae auctae sunt usque ad quatuordecim libras cum dimidia. Alvus semel aperta. Lingua ficcissima, & sitis quotidie augetur. Pulsus debiles.

*Repetatur decoctum chinae cum aqua cinnamomi, dein*

*R. Vini optimi libras tres,*

*— — malacensis libram unam.*

*Detur pro potu.*

*R. Unguenti mercurialis drachmam unam  
cum dimidia.*

*Pro fridione.*

*Pars II.*

**L.**

*Die 79. —*

Urina ut heri. Lingua sicca persistit. Alvus semel est mota. Frigus ad crura minus molestum. Praeter potum a nobis praescriptum assumpsit decocti hordei libras duas.

*Repetantur omnia, dein intret in balneum tepidum*

*Die 80. —*

Debilitas aucta videtur, caetera eodem modo se habent ut heri. Continuetur in singulis, excepto balneo.

*Die 81. —*

Urinae libras 13 minxit. Praeter vinum, duodecim fere decocti libras potavit. Virium prostratio quotidie maior fit; lingua minus sicca videtur.

*Continuetur in praescriptis. Instituitur iterum urinae analysis.*

*Die 82. —*

Lingua denuo est sicca, ut antea. Uri-

nae auctae sunt usque ad 17 libras. Alvum semel deposuit. Salivatio nulla. Caetera ut heri.

*R. Camphorae rasae grana decem.*

*F. cum extract. cort. peruv. bolus.*

*Dentur doses tales VI. Capiat omni hora unam.*

*R. Vini optimi libras duas.*

*Detur pro potu.*

*R. Vini malacensis uncias sex.*

*Capiat paulatim.*

*Die 83. —*

Res fere eodem modo incedunt, urinae tamen imminutae sunt, ita ut earum pondus ad libras duodecim cum dimidia solummodo ascendebat.

*Continuetur in praescriptis.*

*Die 84. —*

Urinae libras 11 minxit. Lingua valde sicca. Frigus ad pedes denuo accusat. Alvum semel deposuit. Sitis ut heri.

L 2



*R. Emulsionis arabicae uncias octo ,  
Camphoræ rasæ drachmam unam .  
M.*

*Capiat omni quarta horæ parte cochleare unum .*

*Continuetur in vino ut supra .*

*Die 85. —*

*Potavit ut heri , urinae libras 12 minxit .*

*R. Decocti corticis peruviani unc. novem ,  
Syrup. papav. albi unciam unam ,*

*Capiat ut supra .*

*R. Unguenti mercurialis drachmam unam .*

*Continuetur in vino .*

*Die 86. —*

*Sitis non valde molesta fuit : præter vinum , libram unam & semis decocti potavit . Urinarum pondus ad 12 libras , & uncias sex ascendebat .*

*Vespere ,*

*Repetantur omnia , sed fiat frictio cum*

*drachma una & semis unguenti mercurialis.*  
 Ex facta analyfi urinae, quam minxit die 8o morbi, repertum est, quod in libra urinae uncia fere sacchari delitescebat.

*Die 87. —*

Urinae adauctae usque ad quatuordecim libras.

*R. Tinct. cantharidum guttas duas,  
 Aquae cinnamomi unciam unam.*

*Dentur doses tales nro. tres. Capiat  
 omni hora dimidiam partem dosiſ unius. Con-  
 tinuetur in vino.*

*Die 88. —*

*Res eadem ratione incedunt.*

*R. Tincturae cantharidum guttas duas,  
 Aqua cinnamomi unciam dimidiam.*

*Dentur doses tales nro. sex.*

*Capiat unam omni hora. Continuetur  
 in vini usu. Dein ad vespas.*

*R. Tincturae cantharidum unc. dimidiam  
 Illiniatur ad crura & ad lumbos.*

## Die 89. —

Urinae libras 12 minxit. Alvum semel deposuit.

*Repetatur frictio cum tinctura cantharidum; dein:*

*R. Tincturae cantharidum guttas tres,  
Aquae cinnamomi unciam dimidiam.*

*Dentur doses sex. Capiat more solito.*

## Die 90. —

Urinae pondus est 14 librar.

*Repetatur tinctura cantharidum, & dentur vini optimi librae duae, malacensis vero unciae sex.*

Tinctura cantharidum continuata fuit absque ulla utilitate usque ad diem 97 morbi. Nullus ad renes dolor observatus est, quamvis dosis tincturae usque ad 80 guttas in die ascenderet. Hoc tempore etiam vesicantia ad lumbos absque morbi levamine applicata fuere.

## Die 97. —

Cum nulla utilitas ex cantharidum tinctura observata sit, sequentia propinata fuere.

*R. Decocti chinae uncias decem,  
 Gummi kino vitello ovi soluti drach-  
 mam unam cum dimidia.*

*Capiat more solito.*

*Continuet in vino.*

Continuavimus in gummi kino usque ad diem 107 morbi, & quamvis magna dosi exhiberetur nempe ad unciam unam cum dimidia in die, attamen aegrotus nullum levamen habuit; immo res in peius quotidie ruebant. Quare ad alia transivimus remedia.

*R. Cupri ammon. granum unum,  
 Sacchari albi scupulum dimidium.*

*M. Capiat ter in die dosin talem.*

*R. Decocti corticis peruviani uncias novem,  
 Extrañi corticis eiusd. drachmas duas,  
 Mucilag. arabici unciam unam.*

*Capiat more solito.*

*Continuetur in vino.*

Hæc remedia per tres alios dies, nulla subsequente in morbo mutatione, assumpsit miser, qui, quum singulorum pharmacorum inutilitatem videret, propriam petiit domum. Ibi pauco tempore elapso, vitam cum morte mutavit.

## CAPUT IX.

*Hydrops.*

**E**X quatuor aegrotantibus, quos, *Ascite* affectos, in Clinico Instituto pertractavi, unius tantum historia memoratu digna mihi videtur. Cunctos hosce aegrotos, hydropem a causa locali producto affectos fuisse, vix dubito. Docet id sectio cadaveris aegri, cuius postea historiam proferam, ac omnium remediorum, quae adhibita fuere, inutilitas; quare tres ex infirmis ob morbi nimiam durationem domum, morbo adhuc detentos, mandavimus.

Praeter hydropem illum, cui vitium quoddam locale ansam porrigit, duo alia huius aegritudinis genera admittenda esse censeo. Non enim unusquisque hydrops, qui a morbo totius systematis originem ducit, *debilitatis* est effectus. Hanc scilicet tum BRUNONIS (a), tum WEIKARDII (b) sententiam,

---

(a) Elem. Med. BRUN.

(b) WEIKARD Med. pract. Handbuch p. 276.

duce experientia, meam facere haud possum. Non tam rari sunt *hydropes* vere *sphenici*, in quibus auxilia antiphlogistica, immo hinc inde ipsa venae sectio, requiruntur. In Clinico Instituto pluribus abhinc annis foeminam asciticam, vino potius deditam, quae antea excitantium sub usu de die in diem in peius ruebat, venae sectione repetita sanatam observare mihi licuit. Nuper a Patre optimo in Clinicum Institutum Ticinense puella anasarca detenta suscepta est, cuius morbus a corroborantibus manifeste augebatur. Propinato cremore tartari, nitro, urinae mox fluxerunt, atque brevi temporis spatio convaleuit. Hydrops ille qui saepe scarlatinam sequitur, non rara solius venae sectionis usu curationem admittit (a). Frequentius, quod omnes fatentur, *anasarca* indolem inflammatoriam assumit. Videtur autem hoc ipsum non tamen saepe ab ipso morbi initio, quam sub eius progressu contingere. Miri huius phaenomeni causa ex duplici ratione mihi pendere, videtur. Praeter illud enim, quod a dispositione phlogistica aquae inter cutem & carnes colligi possint; possunt & hae ipsae maiori copia sta-

---

(a) BORSIERI Institut. Med. Vol. II. §. 90 —  
 Avvisi sopra la salute umana. V. III. — Comment.  
 de hodierna Etrusca Clinica. Ioan. CALVI.

gnantes, in hominibus aliquomodo adhuc in phlogosin dispositis, tum *extensione solidorum*, has aquas continentium, tum *compressione vasorum* copiosorum, qua sanguis aliena in vasa dirigitur magis, stimulum inflammatoriae affectioni faventem inducere.

Omnes igitur hydropes, qui causam localem minime agnoscunt, pariter ac caeteros morbos, in *phlogisticos* & in *asthenicos*, dividerem. Hos ultimos illis longe frequentiores esse, nemo negabit. In hydropse phlogistico singula evacuantia, uno verbo debilitantia proficua cernuntur; in illo vero, cuius causa in debilitate posita est, haec remedia caute peius & angue fugienda sunt. Omnia ab excitantibus tunc expectare debemus. Cum cortice peruviano & radice serpentariae virginianae hydropem in Nosocomio Ticinensi cito sanavi. Alteri aegroti ope unguenti mercurialis, porrecto simul vino lautoque victu, sanitatem restitui. *Nullum hinc datur remedium specificè diureticum*. Ubi lotium ob diathesin phlogisticam non rectè procedit, ibi debilitantia; contrario in casu, scilicet ubi atonia urinae secretionem perturbat, tonica, diureticam virtutem exercent.

Minime tamen negaverim, quaedam pharmaca praeter stimuli, quo super universum corpus agunt, rationem, corporis partem ma-

gis afficere, ac ibidem praecipue actionem suam exercere. Hac ipsa de causa *scillam marinam*, *digitalem purpuream* (a), *mercurium*, aliaque, dum de hydropis athenici curatione agitur, caeteris excitantibus, quae totum systema aequali vi afficiunt, roborantque, anteposenda sunt. Summam horum remediorum virtutem, simul aliis roborantibus porrectis, ac praesertim concessio victu animali cum vino, non semel compertus sum. Ubi vero hydrops a causa locali producitur, omnia auxilia, sive

---

(a) *Digitalis* quoque *epiglottidis* usum hic loci commendare mihi concessum sit, quippe qui multis experimentis instructus de huius remedii utilitate in hydrope atque in aliis morbis a virium vitalium languore lento exortis, satis superque pro certo habeo. Sequen-ribus distinguitur notis: *Digitalis epiglottis*: *Nova ex Pannonia species*: ex Classe Didynamiae, & ordinis Angiospermae. — *Essentia speciei consistit in corolla subglobosa, bilabiata*: labio superiore longissima, ostium floris obtegente. *Habitus plantae accedit ad digitalem ambiguum; sed grandior & vitae biennis*. Praescribitur in pulvere, ex foliis plantae, ad dosim gran. semis, vel gran. unius ter, quaterve in die. Ipsius vim medicam illam *digitalis purpureae*, aliarumque uti *ambiguae* & *luteae*, superare mihi videtur; atque aegrotus sub ipsius usu, quamquam magno, neque de angustia, neque de cardialgia, neque de dolore in supercilio conqueritur; uti contingit, quoties medici largiorem *digitalis purpureae* dosim praescribunt. Alio tradam loco (*Ratio mendandi Vol. I. Tab. I.*) huius plantae historiam physico-medicam & icona (*Editor.*)



antiphlogistica, five excitantia inutilia prorsus evadunt (a). Casus hic eheu! nimis saepe curantibus sese offert. En eiusdem luculentissimum exemplum.

## HISTORIA (b).

*Joseph Birolì* juvenis 22 circiter annos natus, bachanalium tempore vix praeterlapso,

(a) In hydropse a causa locali producta, non solum morbus ab atonia & virium vitalium prostratione pendet, verum etiam ex secretionis adaueta, & simul resorptione impedita exoritur. Huius hydropis species ut plurimum in abdomine contingit ex viscerum abdominalium infarctu, vel praeternaturali incremento; quam in rem mercurialia praecipue laudarunt LYSONS (*Medic. Transact.* Vol. III.) & alii. Verum non semper mercurialium actionem libenter patitur aegrotans, neque hydrargyrius unicuique corporis conditioni consonus videtur. Qua de re hoc in casu ad aliam medendi methodum confugere coactus fui. Scillae nempe maritimae, vel digitalis epiglottidis pulvis solvatur in salivae, vel succi gastrici sufficienti quantitate, & axungiae porcinae ope fiat linimentum. Hoc linimento lumborum regio, coxarum interior pars confricantur eo ipso met momento, quo aegrotans medicamentis solventibus in viscerum abdominalium morbofis incrementis indicatis utitur. Hac medendi methodo plures aegrotantes curare potui, inter quos praecipue unius historiam contemplari dignissimam (*Commentarij Medici. Decade prima. Tomo II.*) meo in opere periodico recudi curavi (*Editor*).

(b) Hanc historiam D. Doct. *Celsus CIANI Senensis* descripsit.

postquam largam vini copiam, ac magnam carnis sale conditae portionem ingurgitaverit, derepente a vomitu correptus est. Dolores circa regionem iliacam finitram associati sunt emesi. Febris, quae sub hisce rerum conditionibus quoque in conspectum prodit, paucos post dies, sponte infimul cum vomitu & abdominis cruciatibus disparuit. Per quatuor circiter dies secunda valetudine aeger gavisus est, quo tempore elapso, singula vix memorata symptomata rediere. Post biduum vero iterum vomitus disparuit, remanente tamen febre, quae aegrum per viginti dies detinuit. Accersitus Chirurgus venae sectionem instituit, qua perracta, faciei, extremitatum inferiorum tumor in conspectum venit. Inflatur paulo post & abdomen, adparente simul diarrhoea. Sitis de die in diem augetur, imminuitur vero lotium. Idem Chirurgus sal amarum aliaque debilitantia propinavit. Hydrops tamen quotidie maior fiebat. Tussis, quae cum sputis non sanguineis absolvebatur, accessit. Respiratio expedita erat hinc inde tamen aeger palpitationem cordis patiebatur. Duos menses sub tali statu domi trivit, quo tempore elapso, Clinicum Institutum die 11 Maii ingressus est. Totius corporis anasarca mox observavimus. Venter valdopere ob aquas tumebat. Cordis creberrimi ictus multum ir-

regulares cum pulsu nequaquam corresponde-  
bant. Respiratio vero semper facilis compa-  
ruit. Cutis sicca, calor naturalis, pulsus par-  
vi, debiles valdeque frequentes, tussis cum  
excreatu, fitis magna, ac urinae parcae, fere  
nigrae. Diarrhoea continuabat.

*R. Decoſti corticis peruviani uncias no-  
vem,*

*Aquae menthae uncias duas,*

*Oxymelis squillitici unciam unam.*

*M.*

*Capiat omni hora unciam unam.*

*Diaeta 3 cum vini libris duabus.*

*Mane 12 Maii.*

Noctu paululum dormivit, ter alvum  
deposuit, urinae non multae, pulsus non tam  
debiles.

*R. Decoſti corticis peruviani uncias no-  
vem,*

*Extraſti corticis eiusd. drachmas duas,*

*Liquor. anodyn. drachmas tres,*

*Oxymeli scillit. unciam unam.*

*M.*

*Capiat ut supra.*

*Vespere.*

Urinae auctae sunt, bis alvum deposuit.

*Repetatur medicina.*

*Mane 13.*

Urina augetur; tussis increvit.

*Repetatur medicina.*

*Mane 14.*

Febricitat, pulsus durus, calor cutis auctus.

*Quum a methodo excitante potius damnum conspeximus, seposito vino ac diaeta animali prohibita, cremorem tartari cum nitro porreximus.*

*Vespere.*

Alvum ter deposuit, pulsuum frequentia minor, calor cutis quoque imminutus.

*Nil praescriptum est.*

*Vespere.*

Diarrhoea increvit, vomitum semel passus est. De summa debilitate conqueritur.

*R. Decoñi corticis peruviani,  
Emulsionis arabicae ana uncias sex.  
M.*

*Capiat omni bihorio uncias tres.*

*Instituatur Paracenthesis.*

*Vespere.*

Paracenthesis ope XXIII. librae aquae  
eductae fuere. Tussis ac febris auctae. De sat  
magna anxietate aeger conqueritur.

*Continuetur in medicina.*

*Mane 16.*

*Nil novi.*

*Repetatur medicina.*

*Illiniatur unguento mercuriali ad drach-  
mam dimidiam.*

*Mane 17.*

*Urinae auctae; alvum non deposuit.*

*Repetantur singula.*

*Mane*

*Mane 18.*

Noctu dormivit, urinae copia eadem, sed venter iterum intumescit.

*Repetantur singula.*

*Mane 19.*

Venter iam pristinam molem acquisivit, ter alvum deposuit, stupidum cum pulsu valde frequente, parvo ac inaequali aegrotum conspeximus.

*Rx. Decocti corticis peruviani uncias novem,*

*Aetheris vitriolici drachmam unam.*

*M.*

*Capiat omni  $\frac{1}{2}$  hora unciam dimidiam.*

*Habeat vini rubri libras duas.*

*Vespere.*

Cibum evomit; caeterum nil novi.

*Repetatur medicina.*

*Mane 20.*

Post eternam visitationem aeger pessime

*Pars II.*

*M*

se habuit. Comparuit nempe summa anxietas, ac respirandi difficultas, sub qua facies nigrescebat.

*R. Decodi corticis peruviani uncias novem,*  
*Spiritus nitri dulcis drachmas duas.*  
*M.*

*Capiat ut supra.*

*R. Vini malacensis uncias sex.*

*Vespere.*

Anxie ac summa cum difficultate respirabat.

*Mane 21.*

Omnia in peius rüunt. Revera post trium horum a visitationis tempore, aeger cadaver erat.

*Historia sectionis.*

Thorace lege artis aperto, mox infra sternum oculis se obtrudit tumor praegrandis, fluctuans, totam fere thoracis cavitatem replere visus. Pulmones mole naturali longe minores ab hoc tumore quasi compressi in po-

steriorem cavi partem confugiebant, sed sani, substantia integri, neque ad superficiem inflammati; his elevatis ad fundum utriusque pleurae, sacci purulenta aqua repleti deprehendebantur, aëst quantitate perexigua.

Tumorem illum nunc accuratius perspectum pericardium esse constabat, ingenti modo expansum, ita ut adiacentibus partibus rescissis pondus librarum XI. aequaret. Illa dein pericardii portione, quae centro tendineo diaphragmatis adhaeret, cauta manu dissecta, purulenta materies magna vi ad libras circiter sex erupit.

Effluxo e pericardio liquido, eiusdemque pariete antica a septo transverso abscissa & in superiora conversa, rarissimum Adstantes mirari phaenomenon potuerunt: tota enim, & amplissima pericardii cavitas vacua se ostendebat, sine ullo cordis vestigio.

Erat enim cor ope limphae coagulabilis, quae vigente inflammatione secreta fuit, ad posteriorem pericardii partem arcte agglutinatum, & ad anteriora a pseudo-membrana ita obductum, ut oculis sese absconderet.

In abdomine nihil notatu dignum aut ad rem pertinens detectum est, si hepar excipias mole auctum & partibus vicinis hinc inde morbose concretum.



## CAPUT X.

*Morbi convulsivi.*

**V** Etula asthmate convulsivo, omni fere hyeme redeunte, iam a nonnullis annis laborans, in Clinicum Institutum cum symptomatis quibusdam hydrothoracis recepta est. Incassum ibi *gummi ammoniacum*, *decoctum corticis peruviani*, *opium*, aliaque excitantia seu, ut vulgo dicunt, antispasmodica adhibuimus, nam misera post quindecim circiter dies obiit (a).

Puellam epilepticam per mensem cum remediis excitantibus ita tractavimus, ut paroxysmi, licet hinc inde in conspectum sese prodidissent longe tamen rariores ac mitiores minusque diuturni redditi fuerint. Aegrota tunc sponte, nobis nolentibus, Nosocomio *valledixit* (b).

---

(a) Hanc historiam conscripsit *Iacob. GIOVANELLI* Tyrolensis.

(b) Hanc historiam conscripsit *D. D. Ioannes NICOLINI* Mediolanensis.

Praeter allatos aegrotantes, nullus morbo convulsivo detentus, Clînicum Institutum ingressus est, si puellam diro singultu chronico affectam excipiam, quem, inutiliter adhibitis prius *opio, moscho, aethere, castoreo, valeriana, assa foetida, cortice peruviano*, tandem cum *floribus zinci* perfecte sanavi, cuiusque historiam utpote attentione Medicorum dignissimam nunc exponere aggredior.

## HISTORIA (a).

Orphana a prima nativitate, miserrimam vitam, inedia inter & febres intermittentes, usque ad decimum secundum aetatis suae annum, perduxit, quo tempore in orphanotrophium pie suscepta est. Ibidem vix pristinum vivendi modum cum meliori commutavit, nam ad labores, debili puellae compagini minime accommodatos, coacta, victu haud nutriende utens, non raro verberibus caesa, pathematibus animi deprimentibus vexata, de die in diem magis magisque debilitabatur. Sub hac rerum positione puella ad decimum septimum aetatis suae annum, catamenia parva copia

### M 3

---

<sup>a</sup> (a) Hanc historiam D. D. *Alexander MORESCHI* Mediolanensis conscripsit.

ac irregulariter quovis fere tertio mense passa, perducta est. Tunc temporis, mense scilicet septembris anni 1794, a dolore punctorio valde acuto, ad thoracis latus finistrum, inter quintam ac sextam costam veram sedem suam figente, prehendebatur. Dolori huic, febris quaedam lenta, nunc more continuarum, nunc sub intermittentis specie, ingrediens, successit. Mense novembris eiusdem anni, ne quid mali deesset, perseverantibus dolore illo ac febre, *singultus* oritur, qui diu noctuque graviter admodum saeviens, fractas aegrotae vires magis magisque immittit, dolorisque illius sensum longe plus adauxit.

In auxilium (potius in perniciem) vocato Medico, venae sectiones instituuntur, ac repetito alvum ducentia remedia consuluntur. Quum ab hac methodo nil boni observaretur, immo quum quotidie puellae salus in peius rueret, denique *moschus*, *ippecacuanha*, *opium*, *vesicantia*, nec non sic dicta *anthelmintica*, aliaque incassum praescripta fuere. Nono, a febris ac doloris ingressu, mense, septimo vero singultus, Clinicum Institutum, die 14 Maii, anni 1795 ad vespertas, sequentia efferens, petiit.

Vehemens singultus, suffocationem non raro minitans, qui in platea, centum circiter

passibus a Nostocomio distante, a praetereuntibus persentiebatur, aegrotam incredibili vi, ita quidem convellebat, ut saepe vix loqui potuerit. Dolor thoracis abhinc non parum augebatur. Abdomen molle.

Caput intense dolebat, ac de aurium tinnitu, oculorumque obnubilatione misera valdopere conquerebatur. Adspectus aegrotae erat cachecticus, cutisque albißima observabatur. Facies interim hinc inde, praesertim vero sub paulo fortiori singultu, valde rubebat. Pulsus parvi ac frequentes admodum erant. Nulla febris observata est. Debilitas totius systematis clare nobis necessitatem methodi excitantis monstrabat, quin ab ipsa multum expectare nobis liceret: cum de vitii organici praesentia, ob morbi longitudinem ac inutilitatem remediorum antispasmodicorum, quae ab altero Medico adhibita fuere, non inconsulto suspicio alimentaretur. Nihilominus sequentia propinavi:

*Rx. Emulsionis arabicae uncias sex,  
Haustus narcotici uncias tres.*

*M.*

*Capiat omni dimidia hora cochleare unum.*

*Rx. Infusi chamomillae uncias sex,  
Affae foetidae vitel. ovi solutae drachmam unam.*

*Detur pro clystere . Iniiciatur omni tri-  
horio dosis similis .*

*Diaeta 3.*

*Die 19 Maii . Mane .*

*Nox insomnis fuit , & dolor eadem vi  
continuabat . Singultus frequentia , sed non vi  
imminutus .*

*Repetatur medicina ; augeatur tamen hau-  
sus narcoticus ad uncias quatuor .*

*Repetantur enemata & diaeta .*

*R. Vini malacensis uncias septem .*

*Hora I. pomeridiana .*

*Singultus adeo increvit , ut , de vitae  
aegrotantis timentes , sequentia praescripserimus .*

*R. Aquae cinnamomi uncias duas ,  
Laudani liquidi Sydenhami scrupulum  
unum .*

*M.*

*Capiat omni quinto minuto cochleare di-  
midium .*

*℞. Decocti corticis peruviani uncias sex,  
Laudani liquidi Sydenhami scrupulum  
unum.*

*Detur pro clystere. Dentur doses tales  
Nro. III.; iniiciatur omni hora dosi.*

Medicinam evomit; quare omni hora  
granum unum opii in pilula porrigebatur.  
Dein

*℞. Linimenti volatilis uncias tres.  
Illiniatur abdomini.*

#### *Hora IV.*

Iterum vomitum passa erat, singultus ta-  
men imminutus fuit.

Quare cibum ex ovo, vino, ac saccharo  
paratum propinavimus.

#### *Vespere.*

In eodem statu invenimus aegram.

*℞. Opii puri grana sex,  
Mosch. optimi,  
Extracti corticis peruviani ana drach-  
mam dimidiam.*

*M.*

*F. cum syrup. simpl. massa pil. divid.  
in XXX. p. aeq. cap. iij. III. omni hora.*

*R. Vini malvatici uncias sex.*

*Renoventur clysmata, & eibus ille ex  
ovis. Habeat praeter dietam tentiam, di-  
midiam pulli partem, cum vini rubri libris  
duabus.*

*Mane 20.*

Noctu per trihorium dormivit, ac singul-  
tus valde mitis observabatur, rediit vero  
ipse, revertente die, nova vi. Dolor pectoris  
ille cum abdominis cruciatibus miseram quo-  
que detinebat.

*Repetantur pilulae, augeatur moschi do-  
sis ad grana LX. Repetantur singula, ac  
fomentationes emollientes ad abdomen appli-  
centur.*

*Vespere.*

*Aliquantisper melius se habebat.*

*Continuetur in pilulis. Dein.*

*R. Aquae cinnamomi,*

*Hausus narcotici ana uncias quatuor.*

*Capiat omni hora cochleare unum. Re-  
petantur reliqua.*

*Mane 21.*

Nox placida fuit. Dolores ad pectus atque ad abdomen imminuti. Singultus tam vi, quam frequentia minus vehemens. Alvus semel laxata. Adspectus quoque melior.

*Rx. Aquae cinnamomi,*  
*Hausus narcotici ana uncias quinque,*  
*Extrañi corticis peruviani drachmam*  
*unam.*

*M.*

*Capiat omni  $\frac{1}{2}$  horae cochlear unum.*

*Repetantur reliqua & vini malvatici unciae novem.*

*Vespere.*

Singultus iam a trihorio valde exasperatus. Aegroti medicinam, a qua pondus ad ventriculum persentit, aegre assumit, ac de vertigine conqueritur.

*Rx. Aquae cinnamomi uncias quatuor,*  
*Hausus narcotici uncias sex.*

*Capiat ut supra. Repetantur caetera.*



*Mane 22. Maii.*

Hac nocte singultus & dolores non adeo molesti, ut heri vespere, fuere. Bihorium placidus somnus perduravit. Omnem assumpsit medicinam. Pulsus naturalis.

*Repetatur medicina, cui adde moschi optimi drachmam semis.*

*Continuetur in viâ &c.*

*Vespere.*

Quum e lecto surgere voluisset, vertigines passa est. Caeterum eodem modo se habet.

*Repetantur omnia.*

*Mane 23.*

Nox fuit insomnis, dolores ventris post enematum applicationem, infimul cum illo thoracis, ac singultu, recruderent.

*Seponantur clysmata.*

*R. Haustus narcotici uncias octo,  
Aquae cinnamomi uncias sex,  
Moschi optimi scrupulum unum.  
Capiat more solito.*

*Ingradiatur aegra balneum ad grad. 29*  
*Réaumur.*

*Vespere.*

*Plusies in balneo syncopen passa est.*  
*Caetera eodem modo.*

*Continuet in omnibus.*

*Mane 24.*

*Aliquantisper nocte elapsa dormivit, dolores infimus cum singultu remiserunt.*

*Repetantur singula.*

*Vespere.*

*Nova vi continuat impetuosus singultus.*

*Continuet in praescriptis.*

*Mane 25.*

*Dormivit, summamque capitis gravedinem accusat. Singultus vix aliquomodo remisit.*

*Vespere.*

*Eodem modo.*

*Continuet in medicina.*

*R. Infusi chamomillae uncias sex.  
 Affae foetid. vitello ovi solutae drach-  
 mam unam.*

*M.*

*Detur doses tales nro. IV. Initiatur  
 una omni quatrihorio.*

*Mane 26.*

Hac nocte aliquantisper quievit, & quum  
 aegrorum custos evigilare eam noluerit, omnia  
 remedia haud assumpfit, qua de causa iussi-  
 mus, ut reliquam medicinam sumeret. *Diae-  
 tam eandem semper concessimus.*

*Vespere.*

De ardore stomachi conqueritur. Caetera  
 symptomata praesertim vero dolor ille eadem  
 ratione continuant.

*R. Emulsion. arabicae libram unam.*

*Capiat paulatim.*

*App. vesicans ut rubefac. sub mamma  
 sinistra.*

*Mane 27.*

Fere nunquam dormivit, ob doloris in-

fenlitate ac fingultus vim. De summa debilitate conqueritur.

*Rx. Decoñi corticis peruviani uncias novem,*

*Castor drachmam unam,*

*Aquae cinnamomi,*

*Syrup. papav. alb. ana unciam unam.*

*Capiat omni hora unciam unam.*

*Appl. thorac. cucurbitulae siccae nro. X.*

*Iniic. clyst. ex assa foetid.*

*Vespere.*

Non assumpsit omnem medicinam, caetera symptomata ac dolor remisere. Alvus bis laxata.

*Capiat reliquam medicinae partem.*

*Mane 28.*

Omnia in melius. Bene dormivit, ac fingultus imminutus est.

*Repetatur medicina. Continuetur in reliquis.*

*Vespere.*

Summus capitis ac ventris dolor. Singultus maxima vi urget.

*Repetatur medicina. Institiatur clyster ex assa foetida.*

*Mane 29.*

Eodem modo misera se habet.

*Repetatur medicina.*

*Vespere.*

Nil mutatum.

*Repetatur medicina.*

*Mane 30.*

Nunquam nocturno tempore dormivit, violens singultus ita continuavit, ut oculos per minutum claudere haud potuerit. Alvus aperta, sed dolores abdominis continuant. Rebus ita se habentibus, considerata morbi longitudine, remediorumque inutilitatem, aegrotantem utpote incurabilem ad orphanotrophium remittendam esse existimavimus; quam unus

cx

ex Commilitonibus (a), usum *florum zinci* proposuerit. Illius consilio, sine magna in hoc remedium fide, annuentes, sequentia propinavimus.

*Rx. Florum zinci granum unum,  
Sacchari albi scrupulum unum.*

*M.*

*Fiat pulvis: dentur doses tales nro. II.  
Capiat unam mane, alteram ad vespas.*

*Vespere.*

Singultus tam vi, quam frequentia aliquantisper est imminutus, dolores etiam quodammodo remiserunt, quievit, sed vertiginibus hinc inde affecta est.

*Repetantur pulveres.*

*Mane 31.*

Hac nocte melius se habuit. Singultus magnopere imminutus est, nec ventris dolores adeo ut alias urgent, alvus vero iam a quatuor diebus clausa.

*Pars II.*

*N*

(a) A. D. Adolph. OTTO Germanus.

*Repetantur pulveres . Auge dosin flor.  
zinci ad grana tria .*

*Iniiciatur clyster ex assa foetida .*

*Vespere .*

Alvus laxata . Tantum semel aut bis  
omni hora singultum sat levem patitur . Adspe-  
ctus melior fit .

*Continuetur .*

*Mane 1 Iunii .*

Placide per totam noctem dormivit , sin-  
gultus admodum rarus , sed quando insurgit ,  
vehemens est . Dolor pectorius pectoris , ac  
abdominis cruciatus protinus disparuere . Al-  
vus laxata .

*Repetantur pulv. ; auge flor. zinci dosin  
ad grana sex .*

*Vespere .*

Singultus relate ad vim remisit . Cacte-  
rum nil novi .

*Continuet in singulis .*

*Mane 2 .*

Bene noctem transegit . Singultus fere  
extinctus est .

*Repetantur pulveres. Habeat ter in die uncias tres decocti corticis peruviani.*

*Vespere.*

*Res optime procedunt.*

*Decoctum chinae nauseam ac stomachi ardorem produxit, quare eodem seposito, haustus narcoticus ad uncias tres praescriptus est.*

*Mane 3.*

*Vix decumbens singultit; placide quievit, dolores abdominis iterum hinc inde insurgunt. Alvus clausa.*

*Repetantur pulv.; auge flor. zinci dosin ad grana novem.*

*R. Decocti chinae uncias novem,*

*Syrup. corticis aurant. unciam unam.*

*Capiat ter in die uncias tres.*

*Iniiciatur clyster more solito.*

*Vespere.*

*A pluribus iam horis singultus non in-*



surgit, alvus soluta est. Decoctum chinæ minime ardorem stomachi produxit.

*Continuetur. Habeat dietam IV. cum nro. I. Zambajone.*

*Mane. 4.*

Singultus in totum disparuit, dolor sub mamma finistri lateris lancinans aegram excruciat, ac tota nocte insomnem detinuit. Pulsus aliquomodo frequentes, ac pleniores videntur.

*Continuetur in decocto corticis.*

*℞. Pulv. flor. zinci grana novem,  
Sacchari albi scrupulos duos.*

*M.*

*Divid. in V. p. aeq. cap. omni trihorio unam.*

*Vespere.*

Dolor ad pectus disparuit & omnia in melius.

Aegrota ab illo tempore eadem cum methodo pertractata est usque ad finem mensis Iunii, quo tempore sanata prorsus ac robusta nosocomium dereliquit; & nunc iam per annum optima gaudet valetudine.

## CAPUT XI.

*Lues venerea.*

QUum in Clinicum Institutum Chirurgicum quamplurimi aegroti veneri a celeberrimo illius instituti Professore, Antonio SCARPA, recipiantur, tyronesque sic satis, circa huius morbi naturam ac curationem edoceantur, paucos lue detentos aegrotantes apud nos pertractari mos est. Ego tamen septem aegrotos syphilide affectos, in Clinicum Institutum, cui praefixus eram, suscepi, qui singuli, praeter foeminam quandam, varias ob rationes ante curationem perfectam ad suos missam, sanati e Nosodochio egressi sunt.

Varias praeparationes mercuriales, praesertim vero *mercurium sublimatum corrosivum* opio nuptum, in aegrotis non adeo sensibilibus, ac in illis, qui nullam pulmonis labem praeseferebant, summo cum fructu adhibui. Sequenti formula utor:

N 3

*R. Mercurii sublimati corrosivi grana*  
*quatuor,*

*Solve lege artis; Adde*

*Opil puri grana duodecim,*

*Extracti corticis peruviani scrupulum*  
*unum.*

*M.*

*Fiat cum syrupo simplici massa pilular.,*  
*quam divide in XVI. partes aequales.*

Ab initio dosin unam vel alteram quaque die, aqua solutam, propino. Si stomacho ieiuno cardialgia oritur, tunc pilulae ientaculum praemittere iubeo, quo fit, ut imminuta huius organi sensibilitate, remedium facilius perferri ab aegroto possit. Sub morbi decursu demum non raro tres doses, rarissime vero quatuor, summendas suadeo. Quo tempore sublimatum praescribo, semel tantum choliciam abhinc ortam observavi (a), quae tamen

---

(a) Sublimatum corrosivum saliva solutum ( *Commentary Medici. Decade I. Tom. I. pag. 146.* ), & adipis suillae depuratae ope sub linimenti forma redactum pluries in Clinico-Instituto adhibui, frictiones nunc ad brachia, nunc ad coxam, nunc ad crura praescribendo. Omni trihorio vel quadrihorio frictio cum sublimati granis quatuor vel sex infiruebatur. Frequenter cholici dolores insurgabant, qui quandoque aegrotantem per horas cruciabant. Sola frictionum intermissione dolores evanescebant, nulloque alio remedio uti, constanter coactus fui ( *Editor* ).

exhibito primum sic dicto *hepate sulphuris* absque levamine, dein emulsionis arabicae sub usu, cui parvam opii dosin adieci, cito disparuit. Rarissime salivationem sub praeparatione mercuriali, de qua loquor, ortam esse consexi.

Nanquam morborum venercorum curationem soli mercurio confido; constanter enim opium, balnea calida, corticem peruvianum, diaetam, lautam, vinumque, aegrotantibus consulere sum usus.

An luis perfectam sanationem, absque mercurio, excitantium sub usu, obtinere queamus, ardua est quaestio (a). Quam nunc exponere aggredior historiam, affirmative potius responderet. Lectori benevolo, hanc ut ipsam accurate examinet ac videat, an revera a lue affecta aegrota fuerit, relinquo. Ego enim id

(a) Absque mercurialium usu luis sanationem persolvere posse non dubito. *Oxyginii* actioni luis curatio tribuendam esse mihi videtur. *Acido nitrico*, *oxyginio saturato*, aqua diluto luem pluries sanasse affirmat DUNCAN celeberrimus; feliciori eventu hanc methodum bis sequutus sum. Praescribebam nempe acidi nitrici oxyginio saturati drachmam in aquae fontis libris duabus, quam repetitis vicibus sumebat aeger intra nycthemeri spatium. Iam alio loco dixi (*Commentary* l. c. p. 64.), efficacior fore in luis curatione illam mercurii praeparationem, quae maiorem oxyginii quantitatem exhibet. Quo vero ad opii in luis venereae curatione actionem, alio dicam loco (*Sylloge Opusculorum Vol. II.*), quae sentio, & in praxi confirmata habere potui (*Editor*).

solum sancte asserere possum, foeminam nunquam mercurium assumpsisse, & a morbo venereo, nisi valdopere fallar, sanata fuisse.

## HISTORIA (a).

*Rosa Ragni ex S. Alessio, Dominico Presb. Papiensi* nupta, triginta annos nata, parce menstruata, semper hucusque secunda valetudine gavisae est. Mense novembris anni 1794, quo tempore maritus blennorrhoeae laborans in Nosocomio degebat, & aegrotata nostra ab eodem morbo sese prehensam vidit. Praeter consueta blennorrhoeae symptomata, ulcera ad genitalia comparuere, quae tamen paucos post dies, nullo adhibito medicamine, evanuerunt. Continuante aqua vi profluvio e genitalibus, amica quaedam, aegrotatae nostrae consilium dedit, ut balneo tepido pedes quotidie committeret. Tria sic adhibita balnea, fluxum, omniaque symptomata sistencia, spem miserae, de recuperata valetudine offerebant. Verum mox sub molestissimo pruritu maculae roseae, glabrae, a lecti calore copiosius prorumpentes, absque cutis desquamatione disparentes, ad pectus, inguina, antibrachium,

---

(a) A. D. Doct. *Fauslipo* PERINI Mediolanensi descripta.

coxasque effloruere. Hisce sensim sine sensu bubo in inguine sinistro, motum impediens, valdeque dolens, associatus est. Quindecim circiter ante dies, praeter symptomata hucusque memorata, dolores ad scapulas, brachium & genu sinistrum, noctu sese exacerbantes, sese prodiderunt. Die 17 ianuarii anni 1798 in Clinicum Institutum suscepta aegra sequentia nobis obtulit.

Pudenda scilicet levi phlogosi correpta, & muco cooperta sunt. Ulcera nulla. Min-gendo, ardorem persentiebat. Bubo eodem modo sese habens, sub compressione valde-pere dolebat. Fances aliquantisper dolore ac rubore afficiebantur, ulcera tamen ibidem non comparere. Cutis efflorescentia rubrum, sed pallidum colorem, praeseferebat. Propinavimus sequentia:

*R. Decocti corticis peruviani uncias no-  
vem,*

*Laudani liquidi Sydenhami guttas quin-  
decim,*

*Syrupi corticis aurant. unciam unam.*

*M.*

*Capiat omni bihorio uncias duas. Ingre-  
diatur balneum calidum ad 29 gr. ther. Reau-  
mur. Applicetur buboni catoplasma ex lacte  
e mica panis confectum.*

*Diaeta tertia.*

*Vespere.*

Fassa est, dum in balneo haerebat, se melius ac facilius brachia movere potuisse. Dolores moderati fuerunt.

*Capiat binis vicibus haustus narcotici uncias duas.*

*Mane 19.*

Bene dormivit, dolores mitiores sunt, aliqua irritatio, tensio & durities apparet in inguine dextro, quin glandulae moles aucta sit.

*R. Decocti corticis peruviani uncias novem,*  
*Laudani liquidi Sydenhami guttas viginti,*  
*Syrupi papaveris albi unciam unam*  
*& semis.*

*Capiat ut supra.*

*Linimentum volatile buboni dextro, sinistro vero, cataplasma anodynum, imponatur.*

*Repetatur balneum ad grad. 24 Reaumur.*

*Vespere.*

Conquesta est de balneo nimis frigido.

*Rx. Haustus narcotici uncias tres.*

*Capiat sex vicibus.*

*Mane 20.*

*Ardor mictionis aequae ac fluxus disparuerunt. Optime quievit, dolores minores.*

*Rx. Decocti corticis peruviani uncias novem,*

*Laudani liquidi Sydenhami scrupulum unum,*

*Syrupi corticis unciam unam & semis.*

*M.*

*Capiat ut supra.*

*Repetantur linimentum, & balneum ad 30 grad.*

*Vespere.*

*Vestigia exanthematis vix adsunt.*

*Rx. Haustus narcotici uncias tres.*

*Capiat more solito.*

*Instituantur frictiones cum panno laneo ad brachium dextrum.*



*Mane 21.*

Dolores minores, bubones paulum decre-  
scunt; sed infarciuntur glandulae fere omnes  
ad collum.

*R. Decocti corticis peruviani unciis no-  
vem.*

*Laudani liquidi Sydenhami guttas tri-  
ginta,*

*Syrupi corticis une. unam cum dimidia.*

*Repetantur caetera.*

*Vespere.*

Doloribus ad calcaneum conflictata fuit.  
Caetera in melius.

*R. Haustus narcotici uncias tres.*

*Mane 22.*

Optime quievit; fassa est se ante puber-  
tatem scrophulosam fuisse. Dolor capitis &  
proclivitas in somnum paulisper augentur, do-  
lores tamen imminuuntur.

*Repetatur medicina heri mane praescripta.*

*Habeat vini optimi libras duas.*

*Vespere,*

Sub magnis abdominis doloribus, alvum deposuit abundanter.

*Repetatur haustus narcoticus.*

*Mane 23.*

Capitis oppressio & aliqua in somnum, sed non molesta, proclivitas cum gingivarum irritatione. Dentes vacillant sub masticatione.

*Repetantur singula ut heri mane.*

*Vespere.*

Dolor capitis continuat, glandulae colli & inguinum adhuc tument.

*Repetantur praescripta ut vespere.*

*Mane 24.*

Nox bona. Bubo incipiens in dextero inguine fere in integrum dissipatus est. Appetit.

*Repetantur omnia ut mane.*

*R. Vini malacenses uncias sex.*

*Diaeta quarta.*

*Vespere.*

Capitis oppressio cum proclivitate in somnum urget, dolores tamen minores.

*Repetantur singula ut vespere.*

*Mane 25.*

Nox bona. Circa matutinas horas tussis cum copioso sereatu insurrexit; dolores mitiores ita, ut absque gravi incommodo vestes ponere & deponere possit. Bubo dexter fere in integrum disparuit; sinister vero multo imminutus; tumor ad glandulam parotidem, pariter ac efflorescentia ad cutem evanuerunt.

*Repetantur omnia.*

*Vespere.*

Nil novi.

*Mane 26.*

Nox inquieta, levis accessit febris, quae cum calore, quem secutus est sudor, incepit: sreatus copiosus aliquibus sanguineis striis tinctus; caetera eodem modo. Caput dolet, noctu artuum dolores molestissimi fuerunt.

*℞. Decocti corticis peruviani uncias novem,*

*Hauftus narcotici uncias quatuor,*

*Capiat omni  $\frac{1}{4}$  horae cochleare unum.*

*Repetantur balneum, linimentum volatile, frictiones cum panno lanco, & vinum malacense.*

*Diaeta quarta.*

*Vespere.*

Tussis hodie mitis fuit absque screatu, ambulavit extra Nosocomium, nec dolores exacerbati fuere, pulsus frequentes.

*Repetantur omnia.*

*Mane 27.*

Aliqua febricula noctu in conspectum venit; tussis cum screatu absolvebatur: sudavit profuse praesertim ad caput, quod dolet. Artuum dolores mitiores, bubones fere subside-  
derunt, debilitas aliqua.

*Repetatur medicina ut mane, cui adde sacchari drachmas duas.*

*Repetantur externa remedia.*

*Vespere.*

Tempore prandii fere in lipothymiam incidit, sudavit in balneo.

*Repetatur medicina ut vespere.*

*Mane 28.*

Sudavit, tussis minus quam antea viget, dolores ad calcanea accusat; nunc bene se habet, sed debilis est, parvum appetit.

*R. Decodi corticis peruviani uncias novem,*

*Extracti corticis eiusdem drachmas tres,  
Haustus narcotici uncias quatuor,  
Sacchari albi drachmas tres.*

*Capiat ut supra.*

*Repetantur externa remedia & diaeta.*

*Vespere.*

Sudavit in balneo.

*Repetantur singula ut vespere.*

*Mane 29.*

Parum hac nocte dormivit, ob vicinam  
aegro-

ægrotantis inquietudinem, sed quod mirum, dolores parum vel nihil exacerbabantur; sudavit quamplurimum, non tussit, aliquis capitis dolor, colli glandulae lymphaticae volumine acutae.

*Repetantur omnia ut mane.*

*Vespere.*

Sudavit quamplurimum & sudat nunc; cephalaea imminuta, dolores vix aegram molestant, alvum parce deposuit sub magnis conatibus.

*Repetantur singula.*

Assistens Instituti Clinici Chirurgici, D. BRANCA, mihi narravit, huius foeminae maritum, qui decumbit in alio Nosocomii Cubiculo, vera lue laborare, atque ante duos menses circiter in Nosocomio cum bubonibus inguinalibus, medorrhoea, epididimitide, ulceribus ad glandem & ophthalmia receptum fuisse. Ibi adhibitis frictionibus mercurialibus, opio, aliisque auxiliis, cito sanatus fuit. Domum restitutus, post 15 dies denuo accessit graviore ophthalmia affectus. Nunc doloribus articularibus noctu exacerbatis, bubone inguinali, qui suppurationem lentam minatur, detentus, sub mercuriali cura adhuc versatur.

*Pars II.*

Q

*Mane 30.*

Sudavit, dormivit, & a doloribus non vexata est.

*R. Decoñi corticis peruviani uncias novem,*

*Extrañi corticis peruviani drachmas duas,*

*Mauslus narcotici uncias quatuor.*

*M.*

*Capiat more solito.*

Ut paucis huic nimis longae historiae finem imponam, dicam tantum, aegrotam cum hucusque indicata methodo per alterum mensem pertractatam fuisse, quo nempe tempore Clinicum Institutum perfecte sanata, dereliquit. Grätias agendi causa, post quartam circiter anni partem, iterum nos, optima firmaque valetudine guadens aegrota, adivit.



## CAPUT XIII.

*Casus varii.*

**P**raeter aegrotantes, de quibus hucusque locutus sum, alii non pauci, variis diversisque morbis affecti, in Clinico Instituto pertractati fuere. Quum vero limites scopusque huius operis, ut in tot distinctis capitibus de illis loquar, non sinant, pauca tantum circa morborum, a quibus afficiebantur, naturam ac exitum, in medium proferam.

*Apoplexia.*

Senem, gracili corporis structura, incedentem, gravissimis animi pathematibus ante morbi ingressum vexatum, ab apoplexia, quam insecuta est hemiplegia, correptum, cum remediis excitantibus inutiliter, nam post mensem circiter obiit, pertractavi (a). Secto ca-

O 2

---

(a) Huius morbi historiam D. D. *Variantio RIGAMONTI* exaravit.



davere, in sinistro cerebri ventriculo sat largam seri sanguinei copiam, ex plexu chorroideo pendentem, deteximus, quae interim mala non pro morbi causa primaria, sed potius pro eiusdem effectu, habita fuere. Methodum excitantem hoc in casu, non auctoritate BRUNONIS ac WEIKARDII (quam tamen magni facio) ductus, sed quia sana ratio eandem postulabat, adhibui. Causae enimvero, quae aegritudinem induxerunt, symptomata quae ipsam concomitabant, omnia haec, inquam, asthenicam morbi naturam ultro confirmare mihi videbantur. Gracilis etenim, de quo locutus sum, senex, aerem non parum inquinatum in habitatione angusta ac humida respirabat, atque iam per plures ante morbum dies, de summa debilitate, ac appetitus iactura, conquerebatur. Facies erat pallida, oculi moesti, pulsus tardus, sed durus, uti fere constanter in senectute, quo vitae tempore vasa facile rigescunt, observatur. Sub hac rerum conditione venesectionem (quam tamen ideo non in quavis apoplexia improba-verim) indicatam fuisse, certe nemo erit qui dicat. Recte hinc, paucam immo minimam, quae remanebat, spem, in corticis, arnicae, ac vesicantium usu, me posuisse, arbitror; quae auxilia, licet morbum in vitium locale commutatum, sanare non potuerint, nullum

nam detrimentum attulisse, confidenter existimo.

*Hepatitis chronica cum febre nervosa incedens.*

Puer duodecim circiter annorum, iam semel duobus abhinc annis, in Clinico hoc Instituto ab hepatitide ita quidem liberatus, ut semper aliquem dolorem ac ponderis sensum in iecinoris regione persentiret, iterum, post cibum calide nimis assumptum, pristinum in morbum incidit, ac prope iam satis aegritudine meae commissus fuit curae. Praeter consueta hepatitidis symptomata dirissimae febris nervosae signa praesto erant. Venaesectio a Medico alio instituta, morbi manifestum augmentum induxit; quare, omnibus rite perpensis, methodum excitantem adhibendam esse, statui. Revera sub moschi, opii, vesicantium, sed praecipue sub balneorum calidiorum usu, aegrotans brevi temporis spatio sanatus, suam petiit domum. Remanebat vero adhuc durities illa ac ponderis sensus in hepatis regione, quae mala de morbi recidiva timorem nobis incutiebant. Non erravimus: nam post duos circiter menses derepente, nulla evidente causa porrecta, a pristino correptus est morbo, qui interim, adhibita indicata iam methodo, profligatus fuit deano.

Superstitem visceris duritiem cum frictionibus mercurialibus, non sine conspicuo levamine, aggressus sum, sed aeger taedio affectus, cito nimis Clinicum deseruit. Institutum, Ab illo tempore eiusdem bona vel mala sors, incognita mihi mansit.

### *Phthisis* —.

Quinque aegrotantes phthisi pulmonali laborantes in Clinicum Institutum, ea ductus ratione, suscepi, ut Tyronibus aliqua, omnem medelam spernentis morbi, exempla ante oculos ponerem, simulque eosdem, ne morbum, illi, de quo agitur, aspectu modo similem, pro vera phthisi, errore satis communi, declararent, monerem. Numerum sane non exiguum aegrotantium, qui a Medicis parum expertis pro phthisicis declarati fuere, hos morbo non laborasse, iterum iterumque convictus fui. Sola enim totius corporis, praesertim vero pulmonum, asthenica constitutio, frequenter phthisin, a quo tamen morbo toto coelo distat, mentitur. Gloriantur tunc Medici se phthisin curasse, quum revera nil nisi systematis universi, pulmonumque imbecillitatem sanaverint. „ Aegrotos non paucos, qui „ a phthisi correpti videbantur, sanavi, ve- „ ra phthisi autem laborantem, *nec unum*

„curare mihi licuit“. Verbis hinc Patris optimi, usus sum. Quum vero morbi, de quo loquimur, diagnosis primo intuitu tam ardua sit, constanter phthiseos curationem, ne mortis sententiam praepostere pronuntiem, cum remediis excitantibus aggredior. Si tunc per mensem unum aut alterum absque sat conspicuo levamine hanc methodum adhibeam, aegrotum, utpote incurabilem, derelinquo, vel saltem studium omne ad symptomata moderanda, impendo. Hunc ut consequar scopum, opium, corticem peruvianum, vel lichenem Islandicum, lac vaccinum, vinum, corporis exercitium, victumque nutrientem, propino: quae singula, licet methodo a celeb. SALVADORI commendatae simillima primo intuitu appareant, ab illa tamen quammaxime differunt. Allatas enim potestates incitantes prudenter ac modica cum vi in usum ducere consuevi; celeb. SALVADORIUS vero illas maximo cum impetu adhibendas esse docuit.

### *Chlorosis.*

Huius morbi, in Nosodochiis curatu difficillimi, octo exempla, nobis oblata sunt. Eundem verum cum methodo excitante ita pertractavi, ut singulae aegrotantes, licet non omnes perfectae sanatae, longe tamen meliori

sub statu versantes, Clīnicum Institutum deserere potuerint. Chlorosis vix non semper ex debilitate illa, cui stimulorum defectus ansam porrigit, oritur. Vita sedentaria, desiderati amoris privatio, animi pathemata deprimētia, victus parvus, aquosus, quae toties chlorosin generant, qua enim ratione agunt, nisi debilitatem directam inducendo? Quum vero in hac astheniae specie corpus humanum valdopere sit sensile sive excitabile, parumque stimuli perferre queat; caute admodum a medentibus indicata pharmaca roborantia porrigenda sunt. Solum corticis peruviani frigidum infusum sub hac rerum positione saepe magnas iam turbas concitat. Idem de vino aliisque roborantibus, praesertim vero de opio, quod pharmaci genus, ob nimium, quo agit, stimulum, chlorosi rarissime accommodatum mihi saltem videtur, dicas. Minima huius remedii dosis hic, uti in reliquis a recta debilitate pendentibus morbis, temulentiam, vertigines, sanguinis e naribus stillicidium, aliaque morbosa phaenomena facili negotio generat. Chlorosis hinc curationem, ab initio saltem, cum exiguo admodum stimulo inchoandam esse, unicuique expertus consulo. *Elixir acidum HALLERI*, in quo medicamine nimia alcoholis irritandi potestas, nescio qua demum ratione, ab adiecto acido sulphurico infringi-

tur, hisce in casibus caeteris omnibus pharmacis anteponendum, duce experientia, puta. Sequenti formula utor:

*R. Aquae fontis uncias decem,  
 — — florum aurantiorum unciam dimidiam,  
 Elixirii acidi Halleri drachmam dimidiam,  
 Syrupi violarum unciam unam.*  
*M.*

*Capiat omni bihorio uncias duas.*

Si aegrotata stimulum ab hoc medicamine illatum perferre queat, post aliquos dies elixirii dosim adaugeo, vel eidem novam quantitatem spiritus vini rectificati superaddo. Deleta hunc in modum nimia excitabilitate, seu alio verbo, aucta corporis stimulum recipientes capacitate, sensim sensimque corticis chinae decoctum aliaque fortiora stimulantia propino. Tunc nempe (communi scilicet methodo) *ferrum*, quod ab initio morbi a ventriculo admodum debili, atque a machina nimis sensibili, perferri haud potest, exhibeo. Aliqua enim in primis viis subactione, & solutione martialia utique indigent, quae si ob harum partium imbecillitatem rite perfici non possunt, plurimis molestiis, praesertim vero

ructibus nidorosis, stomachi oppressioni, ansam porrigunt. Ad ista vel arcenda vel tollenda salutis incommoda, aromatica, cinnamomum puta & alia, non ubique sufficiunt, quum saepe saepius illa calorem augeant, totumque systema nimis irritent. Ipsa adeo *tinctura martis pomata*, ut vocant, licet hac in praeparatione virtus nimis excitans ferri ab adiecto acido vegetabili castretur, aegrotis maxime sensibilibus debilibusque saepe perparum conducit. Relate ad victum, quem chloroticis suadeo foeminis, curam omnem impendo, ut animalis quidem magisque nutriens porrigatur: sed cavere interim oportet, ne ventriculo debiliori nutrimenta eiusdem vires superantia, exhibeantur; nam ut aliquis a cibo corroboretur, non solummodo necesse est, ut alimenta assumat, sed etiam ut ipsa digerat ac in bonum convertat chilum; quae res, lippis & tonsoribus nota, BRUNONEM, quidquid obiciant eiusdem adversarii, latere non potuit. Quoad corporis exercitationem, ad perfectam chlorosis curationem obtinendam, quam maxime necessariam, a nimio eiusdem gradu pariter sensim sensimque ad maiorem ascendendum est. Medici non pauci chloroticarum stimuli perferendi incapacitatem observantes, veramque huius phaenomeni causam ignorantes, ad diathesis phlogisticae praesentiam praema-

tute concludunt, atque antiphlogistica auxilia hac ex ratione adhibendo, morbi causam quotidie longe adaugent.

### *Psora.*

Sex aegrotantes, qui psora laborabant, citò, sepositis quibuscunque demum remediis internis, ac nonnisi topicis adhibitis auxiliis, sanavi. Est enim psora, proprie sic dicta atque legitima, cutis solius, ab insecto (*acaro exulcerante* L.) irritatae, vitium, quam scilicet CESTONII (a) primum, dein REDII (b), experientia confirmatam sententiam, illustris WICHMANNUS (c), quæ summæ in rebus medicis facio, novis cum argumentis meridiana luce clarius comprobavit. Non negaverim plures dari ad pellem humanam aegritudines, quibus hanc usque ad diem psoræ nomen impositum fuit, quæ tamen cutis mala non ab insecto prædicto, sed vel a totius systematis, vel a solius cutis aut imbecillitate, aut forsitan & nimio vigore, generantur. Impetigines vero istæ, licet adspectu psoræ admodum

---

(a) Giacinto CESTONI Lettera al Signor Antonio VALLISNIERI. Vide opere di Francesco REDI.

(b) Ibidem.

(c) Aetiologie der Krätze.



similes, cum eadem tamen, quod indolem prorsus alienam ostendant, ac diversa sibi postulent auxilia, nullo pacto confundendae sunt. Nec etenim hic de nominibus, utpote de re exigui satis momenti, disputatur, quum distinctio, de qua agitur, ad lectulum aegrotantium medentes omnino dirigere debeat. Morbi, singuli non minus, quam illi, qui cutem occupant, relate ad causas, minime vero respectu ad symptomata, dividendi sunt. *Vere scire est per causas scire*; haec divi BACONIS est sententia. Impetiginum doctrina non ob aliam forsitan rationem tantis in tenebris hucusque sepulta iacuit, iacetque adhuc dum, quam quod Medici, qui hanc artis partem tractavere, cutaneorum morborum externum habitum unice fere considerantes, tot distinctas impetiginum species, quot distincta phaenomena in conspectum veniebant, admisserint. Si impetigines, ut singuli alii morbi, in *locales* atque *communes* divisae fuissent, certe in praxi non tam saepe, illae quae e totius systematis vitio propullulant, topicis tantum, atque illae, quibus causa localis an- sam porrexit, internis remediis, pertractarentur. Ipsa psora luculentissimum ultimae sententiae praebet exemplum. Quamplurimi Clinici ad hanc aegritudinem curandam, purgantia, atque decocta varia, *sanguinem*, ut putant,

*purificantia*, vel quod adhuc magis delicatulis eorum auriculis aridet; *sanguinem dulcificantia*, porrigunt. Ego vero, aliorum, Patrisque ipsius exemplum frequens, in psora legitima, dummodo cum alio communi morbo non incedat, remedia tantum topica, praesertim vero *sulphur*, vel *balnea tepida cum hepate sulphuris*, aut *mercurium sublimatum corrosivum in aqua calcis solutum*, exterius adhibeo.

Paucis nunc, quid de *psorae retropulsione* cogitem, ingénue dicam. Si pediculi, ctinones, pulices, aliique huius generis hospites, sub remediorum topicorum usu nunquam reprimantur, vel ad interiora deponantur; cur hoc relate ad insectum quod psoram generat, timendum esse somnias? Remedia quae hinc inde incaute ab inexpertis contra psoram adhibentur, possunt utique plura haud exigua generare mala, quae tamen neutiquam retropulsioni impetiginis adscribenda sunt. Si e. gr. mercurium in psora ita adhibueris, ut cutis morbo sanato, alter, ptyalismus scilicet, in conspectum venerit, an tunc salivationem istam psorae retropulsae & ad glandulam parotidaeam depositae effectum esse, dicas? At vero, cur aliter hoc phaenomenon explicandum, esse credis, quando aliud quodcunque remedium, alia sibi propria incommoda pro-

erant, aut si alterius, & ex causa interna venientis impetiginis species, psorae adpectu tantum similis, ac si localis esset morbus, cum topicis pharmacis incaute vel importune tractata fuerit.

### *Porrigo.*

Duodecim annorum, alias sanissima, puella, totum corpus porrigine coopertum praeseferebat. Omnibus ad trutinam revocatis, morbum ad vitia cutis localia pertinere invenimus. Sepositis hinc singulis remediis internis, balnea tepida sub initio, dein vero oleum olivarum, quo totum sibi corpus cum ipso illiniret, tanto cum fructu adhibuimus (a), ut aegrotam quamoptime sanata Clinicum Institutum deserere potuerit.

Haec sunt, quae paucorum mensium spatium in Clinico Instituto Ticinensi, curae meae commissae, potui observare. Ingenue saltem exposita fuerunt omnia, & ipse morborum, quos pertractavi, eventus, poterit, ni fallor, quemcunque de methodi adhibitae praestantia convincere.

### F I N I S .

---

(a) D. Doctor ALFIERI Mediolanensis huic aegrotae addidit.

# INDEX

## PARTIS SECUNDÆ.

### CAPUT IV.

*Peripneumoniae nervosae, seu malignae.* pag. 5

### CAPUT V.

*Scarlatinae nervosae.* 45

### CAPUT VI.

*Diarrhoeae & Dysenteriae.* 64

### CAPUT VII.

*Uteri haemorrhagiae.* 84

### CAPUT VIII.

*Diabetes.* 97

### CAPUT IX.

*Hydrops.* 168

### CAPUT X.

*Morbi convulsivi.* 180

### CAPUT XI.

*Lues venerea.* 197

### CAPUT XII.

*Casus varii.* 211